

Désherbage du lupin



- Le lupin est une culture peu concurrentielle des adventices : le désherbage de prélevée est indispensable.
- En agriculture biologique comme en conventionnel, ne pas négliger l'intérêt du faux semis avant l'implantation. La herse étrille peut s'utiliser en prélevée jusqu'au stade 2-4 feuilles (dents souples, vitesse lente) comme la houe rotative. Ces interventions peuvent être suivies d'un binage.

Spécialités commerciales	Substances actives	Prélevée	Post- levée
CENTIUM 36 CS	clomazone 360 g/ l	0,3 l/ ha	
CENT 7	isoxaben 125 g/ l	0,8 l/ ha	0,8 l/ ha
PROWL 400/ BAROUND SC	pendiméthaline 400 g/ l	3 l/ ha	

Exemples de programmes autorisés

Dernière mise à jour : mars 2016

Flore	Produits
Capselle, chénopode, coquelicot, morelle, stellaire, renouées, gaillet	CENTIUM 36 SC 0,25 l/ ha + PROWL 400 2,5 à 3 l/ ha
Capselle, chénopode, coquelicot, fumeterre, lamier, matricaire, pensée, stellaire, véroniques, crucifères	CENT 7 0,6 à 0,8 l/ ha + PROWL 400 2,5 à 3 l/ ha
Fumeterre, capselle, gaillet, renouée des oiseaux, stellaire	CENTIUM 36 SC 0,25 à 0,3 l/ ha + CENT 7 0,6 à 0,8 l/ ha
Adventices ci- dessus en très forte pression	association de prélevée suivie de CENT 7 0,8 l/ ha, positionnable du stade 2-4 feuilles à avant début floraison

Source : ARVALIS - Institut du végétal, FNAMS et Terres Inovia

La liste des produits phytosanitaires et les conseils d'utilisation sont mis à jour au 15.03.2016 mais sont susceptibles d'évoluer à partir de cette date. Prendre soin de s'informer des évolutions de la réglementation.