

	Prélevée		Post-levée				
	Programmes à base de (substances actives)	Exemples :	CALLISTO 0,15 l/ha (à renouveler si nécessaire)	CENT 7 0,4 l/ha	CALLISTO 0,15 l/ha + CENT 7 0,2 l/ha (à renouveler si nécessaire)	CLERAVIS, CLERAVO (variété tolérante)	FOX
Capselle	métazachlore, dimétachlore, DMTA-P, péthoxamide	RAPSAN, TERROX, COLZOR TRIO, COLZOR TRIO, ALABAMA, KILAT, etc.,.	dès que conditions favorables				(1)
Sisymbre	clomazone	Axter Centium 36CS Colzor Trio, Centium 36S, etc...	double application				
Diplotaxis	clomazone associée	Axter Colzor Trio, Axter + Butisan S, etc...	(1)	(1)	(1)		(1)
Sanve (moutarde des champs)	métazachlore, dimétachlore, DMTA-P, péthoxamide. L'association avec clomazone améliore l'efficacité	BUTISAN S S, SPRINGBOK, AXTER, COLZOR TRIO, KILAT + clomazone, etc...					
Rapistre		BUTISAN S S, SPRINGBOK, AXTER, COLZOR TRIO, KILAT + clomazone, etc...	(1)				(1)
Ravenelle	aucune efficacité de la prélevée	-			double application		
Moutarde noire	métazachlore, dimétachlore, DMTA-P, péthoxamide. L'association avec clomazone améliore l'efficacité	BUTISAN S S, SPRINGBOK, AXTER, COLZOR TRIO, KILAT + clomazone, etc...	(1)	(1)			(1)
Passerage	métazachlore avec ou sans DMTA-P, dimétachlore associés à la clomazone. Une application préalable de présemis avec napropamide est un plus	COLZAMI puis COLZOR TRIO, AXTER + METAZACHLORE			double application		
Barbarée			double application		double application (si nécessaire)		(1)
Calépine	aucune efficacité de la prélevée	-					

Efficacité nulle
 Efficacité moyenne
 Bonne efficacité
(1) références peu nombreuses