

Spécialités commerciales	Substances actives	Dose d'AMM	Nbr max d'application par an	Mention d'avertissement	Mentions de danger (règlement CLP)	DAR	Restriction sol drainé
AGIL/CLAXON/AMBITION	propaquizafop 100 g/l	1,2 l/ha (annuelles) 2 l/ha (vivaces)	1	Danger	H304-H319-H411	90 j	
ALABAMA	métazachlore 200 g/l + dmta-P 200 g/l + quinmércac 100 g/l	2,5 l/ha	1 (2) (5)	Attention	H317-H351-H400-H410	BBCH 18 (8 F)	
ALTIPLANO DAMTEC/TIACO	napropamide 40 % + clomazone 3,5 %	3 kg/ha	1	Attention	H410	BBCH 07 (prélevée)	
ANITOP	métazachlore 300 g/l + dmta-P 100 g/l + quinmércac 100 g/l	2,5 l/ha	1 (2) (6)	Attention	H317-H351-H400-H410	BBCH 18	
ATIC-AQUA	pendiméthaline 455 g/l	2 l/ha	1	Attention	H317-H410	BBCH 20 (rosette)	
AXTER/AXTANKER/DYNAMO	clomazone 60 g/l + dimétachlore 500 g/l	1,5 l/ha	1 (3)	Danger	H304-H315-H317-H400-H410	BBCH 09 (prélevée)	
BODY	métazachlore 250 g/l + clomazone 33 g/l	3 l/ha	1 (2) (7)	Attention	H317-H351-H400-H410	BBCH 08 (prélevée)	
BUTISAN S	métazachlore 500 g/l	1,5 l/ha	1 (2)	Attention	H302-H315-H317-H319-H351-H400-H410	BBCH 08 (8 F)	
SULTAN/BROTHER 500/RAPSAN 500SC	métazachlore 500 g/l	1,5 l/ha	1 (2)	Attention	H317-H351-H410/+ H315-H319	BBCH 14 (4 F)/19 (9 F)	
CALLISTO	mésotrione 100 g/l	0,15 l/ha	2/2 ans	Attention	H319-H400-H410	BBCH 19 (9 F ou plus)	
CENT 7	isoxaben 125 g/l	0,4 l/ha	1	Attention	H410	BBCH 19 (stade rosette)	
CENTIUM 36 CS (1)	clomazone 360 g/l	0,33 l/ha	1	-	H413	-	
CENTURION 240EC/SELECT/OGIVE VXT	cléthodime 240 g/l	0,5 l/ha	1/2 ans	Danger	H304-H317-H336-H411	BBCH 32	
CIRCUIT SYNC TEC	métazachlore 300 g/l + clomazone 40 g/l	2,5 l/ha	1 (2) (7)	Attention	H351 - H410	BBCH 07 (prélevée)	
COLZAMID (1)	napropamide 450 g/l	2,8 l/ha	1	-	H411	BBCH 09 (prélevée)	
COLZOR TRIO/HERBIUS OSR	clomazone 30 g/l + dimétachlore 187,5 g/l + napropamide 187,5 g/l	4 l/ha	1 (3)	Danger	H304-H317-H319-H335-H336-H400-H410	BBCH 09 (prélevée)	
COLZOR UNO/TEROX	dimétachlore 500 g/l	1,5 l/ha	1 (3)	Danger	H304-H315-H317-H400-H410	BBCH 08 (prélevée)	
ETAMINE	quizalofop-p-éthyl 50 g/l	1,2 l/ha (annuelles) 3 l/ha (vivaces)	1	Attention	H317-H319-H411	90 j	
FOLY R/NOROIT/BALISTIK	cléthodime 120 g/l	1 l/ha	1/2 ans (6)	Danger	H304-H336-H411	BBCH 32	
FOX	bifénox 480 g/l	1 l/ha	1	Attention	H 400 - H410	BBCH 17 (7 F)	
FUSILADE MAX	fluzafop-p-butyl 125 g/l	1,5 l/ha (annuelle) 3 l/ha (vivaces)	1/2 ans	Attention	H361d-H410	90 j	
IELO/BIWIX	propyzamide 500 g/l + aminopyralide 5,3 g/l	1,5 l/ha	1	Attention	H351-H410	BBCH 18 (8 F)	

La réglementation sur les produits phytosanitaires évolue (retraits, délai de commercialisation, etc...). Pour en savoir plus, consulter www.terresinovia.fr

ZNT (zone non traitée) : 5 m par défaut sauf ATIC-AQUA et TORSO (ZNT 20 m).
DVP (dispositif végétalisé permanent) : 20 m pour ATIC-AQUA. 5 m pour les herbicides à base de dimétachlore, certains herbicides à base de métazachlore et FOX, FUSILADE MAX, NERO.

Avant tout mélange s'assurer du respect de la réglementation. Consultez l'outil mélanges de produits phytosanitaires sur www.terresinovia.fr

- (1) Autres spécialités propyzamide : SETANTA FLO, REDOUTABLE PLUS.
Autres spécialités clomazone : AFAENA, CARIMBO 360CS, CLOMASTAR, PERTUS etc.,
Autres spécialité clopyralide : GLOPYRALID, etc.
(2) Produits à base de métazachlore : 1 application tous les 3 ans à la dose de 500 g/ha de métazachlore ou 1 application tous les 4 ans à la dose de 750 g/ha. Ne pas appliquer ce produit sur une parcelle comportant une bétail référencée.
(3) Produits à base de dimétachlore : 1 application tous les 3 ans à la dose de 750 g/ha de dimétachlore.
(4) Ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit avec péthoxamide plus de 1 année sur 3, et pour la clomazone, plus de 1 année sur 2.

(5) Ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du dmta-P et/ou du quinmércac plus de 1 année sur 2.

(6) Ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du dmta-P et/ou du quinmércac plus de 1 année sur 3.

(7) Ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la clomazone plus de 1 année sur 3.

(8) Ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de l'aminopyralide plus de 1 année sur 3.

(9) 0,25 l/ha à partir du stade 2 feuilles, 0,5 l/ha à partir du stade 6 feuilles. Respectez un délai minimum de 2 semaines entre les 2 applications.

(10) Pour une dose comprise entre 1,67 l/ha et 2,6 l/ha, la fréquence d'application est de 1 année sur 2.

(11) Ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du quinmércac plus de 1 année sur 4.

■ Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur sol artificiellement drainé ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45 %.

Spécialités commerciales	Substances actives	Dose d'AMM	Nbr max d'application par an	Mention d'avertissement	Mentions de danger (règlement CLP)	DAR	Restriction sol drainé
KERB FLO (1)	propryzamide 400 g/l	1,875 l/ha	1	Attention	H351-H410	150 j	
KILAT/SUCCESSOR 600 (3)	péthoxamide 600 g/l	2 l/ha	1/2 ans	Attention	H302-H304-H315-H317-H319-H400-H410	-	
LEOPARD 120	quizalofop-p-éthyl 120 g/l	1,25 l/ha	1	Danger	H304-H317-H319-H410	BBCH 18 (8 F)	
LONTREL 100 (1)	clopyralid 100 g/l	1,25 l/ha	1	Attention	H410	BBCH51 (avant D2)	
LONTREL SG	clopyralid 720 g/kg	0,174 kg/ha	1	Attention	H410	BBCH51 (avant D2)	
MOZZAR/BELKAR	halauxyfe-methyl 10 g/l + picloram 48 g/l	0,5 l/ha (9)	1/3ans	Attention	H319- H335- H410	BBCH30 (avant reprise de végétation)	
NERIS	aminopyralmide 30 g/l	0,26 l/ha	1/3 ans	-	H411	BBCH19 (9F)	
NERO/DOUSCO	péthoxamide 400 g/l + clomazone 24 g/l	3 l/ha	1 (4)	Attention	H302-H315-H317-H319-H410	BBCH09 (prélevée)	
NOVALL/RAPSAN TDI	métazachlore 400 g/l + quinmérac 100 g/l	1,87 l/ha	1 (2) (6)	Attention	H317-H351-H400-H410	BBCH 18 (8 F)	
BANDONEON	métazachlore 400 g/l + quinmérac 100 g/l	1,87 l/ha	1 (2) (6)	Attention	H351-H400-H410	BBCH11	
PILOT/COURSIER	quizalofop-p-éthyl 50 g/l	1,2 l/ha (annuelles), 3 l/ha (vivaces)	1	Danger	H304-H315-H317-H318-H332-H336-H400-H410	BBCH 65	
POLAIRE/TALGARD	dmta-P 200 g/l + métazachlore 200 g/l + clomazone 40 g/l	2,5 l/ha	1 (2) (5) (7)	Attention	H351-H400-H410	BBCH 09 (prélevée)	
SPRINGBOK	métazachlore 200 g/l + dmta-P 200 g/l	3 l/ha	1 (2) (5)	Danger	H302-H304-H317-H319-H351-H400-H410	BBCH 18 (8 F)	
STRATOS ULTRA	cycloxydime 100 g/l	2 l/ha (annuelles), 4 l/ha (vivaces)	1 (10)	Danger	H304-H315-H319-H336-H361d-H411	BBCH 32	
TANARIS/SOLANIS	diméthénamid-p 333 g/l + quinmérac 167 g/l	1,5 l/ha	1 (5)	Attention	H317-H319-H400-H410	BBCH 18 (8 F)	
TARGA MAX	quizalofop-p-éthyl 100 g/l	1,5 l/ha	1	Danger	H304-H318-H411	110 j/BBCH60	
TORSO	métazachlore 214 g/l + napropamide 206 g/l + quinmérac 71 g/l	3,5 l/ha	1 (2) (11)	Attention	H317-H319-H351-H400-H410	BBCH09 (prélevée)	
TRIVALDI	métazachlore 500 g/l + picloram 13,3 g/l + aminopyramide 5,3 g/ha	1,2 l/ha en prélevée, 1,5 l/ha en postlevée	1 (2) (8)	Attention	H351 - H410	BBCH 15 (5 F)	
VESUVE MAX	quizalofop-d-éthyl 70 g/l + cléthodime 140 g/l	0,8 l/ha	1/2 ans	Danger	H304-H315-H317-H336-H410	BBCH 32	

