


Attention, en interculture, priorité à la gestion mécanique de l'ambroisie avant l'implantation éventuelle d'un couvert.

Une ambroisie levée tardivement peut fleurir et former des graines rapidement. Une ambroisie coupée est capable de régénérer des rameaux florifères.
L'écimage est-il toujours une solution ?
Vrai ou Faux ?
FAUX ! Selon la date de l'écimage, l'ambroisie peut repartir et cela prolonge la période d'émission du pollen.

En fin d'été, de août à octobre, le pollen d'ambroisie est le principal allergène.



Graines viables très longtemps dans le sol (jusqu'à 30-40 ans).
Il est déconseillé de labourer.
Vrai ou Faux ?
VRAI ! Cela remonte des graines viables et ne permet pas de diminuer les populations d'ambroisie.

Gestion de l'Ambroisie en Tournesol et Soja

Dans les cultures riches en protéines


Lutte contre l'Ambroisie à feuilles d'armoise

en Nouvelle-Aquitaine



L'Ambroisie à feuilles d'armoise est une plante exotique envahissante annuelle, connue pour être à la fois une adventice de cultures et une plante au pollen très allergisant. On la retrouve principalement sur des sols qui ont été travaillés et mis à nu, elle n'aime pas la concurrence. Elle a des levées échelonnées et une capacité de repartir une fois coupée. Sa présence en culture peut engendrer des pertes de rendement importantes.

Nuisibilité des ambrosies sur Tournesol
Rhône-Alpes 1988-1994



Perte de l'ordre de 3 q/ha en tournesol par tranche de 10 ambrosies/m².




Aude Mathiot

Aude Mathiot

Réglementation relative à la lutte contre les ambrosies :

- Décret de 2017 : arrêtés préfectoraux qui rendent obligatoire la destruction de l'ambroisie sur votre terrain.
- Arrêté national de 2015 relatif aux Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) : ambroisie non autorisée en tant que couvert sur les bandes tampons. Si la présence est répétée : réduction de 3% des aides.
- Depuis juin 2011, la réglementation européenne indique que la teneur maximale d'ambroisie ne doit pas dépasser 50 mg par kg de graines destinées à la fabrication des aliments pour animaux.

Leviers de lutte en interculture et en culture de tournesol ou de soja



* Pour une bonne destruction (avant floraison de l'ambrosie) :

- Intervenir tôt après récolte pour profiter de la fraîcheur du sol
- Travailler par temps séchant et suffisamment profond (> 5 cm) pour éviter repiquages
- Si les ambrosies sont développées, envisager des passages croisés

** Pour déstocker :

- Travailler le sol le plus superficiellement possible
- Un rappuyage avec rouleau peut favoriser les nouvelles levées et donc le déstockage
- Intervenir avant une pluie significative
- Puis détruire les nouvelles levées mécaniquement ou chimiquement avant floraison

	Prélevée	Postlevée
Tournesol 	Racer ME 2l/ha OU Proman* 1,5 à 2 l/ha * suivre les préconisations de la firme selon le type de sol	- Double application de Pulsar 40 0,625 l/ha + Actiob B (ou Dash HC) <u>ou</u> double application de Passat Plus 1 l/ha (variétés Clearfield Plus) à 2-3 feuilles du tournesol, renouvelé 8 à 10 jours plus tard. - Double application de Express SX 30 g/ha + Trend 90 à 2-3 feuilles du tournesol, renouvelé 8 à 10 jours plus tard - 1 application de Pulsar 40 1,25 l/ha + Actiob B (ou Dash HC) <u>ou</u> Passat Plus 2 l/ha (variétés Clearfield Plus) à 4 feuilles du tournesol - Viballa 1l/ha (toutes variétés) à partir de 4 feuilles du tournesol (bonne efficacité)
Soja 	Proman* 1.5 à 2 l/ha * suivre les préconisations de la firme selon le type de sol	- Basagran 1 kg/ha (ou Corum 1 l/ha) à 2-3 feuilles du soja, puis 8 à 10 jours plus tard Pulsar 40 à 0,625 l/ha + Actiob B. - Double application de Pulsar 40 0,625 l/ha + Actiob B à 2-3 feuilles du soja, renouvelée 8 à 10 jours plus tard. 3 feuilles du soja = 2 feuilles unifoliées + 1 feuille trifoliée Intervenir sur adventices de 2 à 6 feuilles maximum. Au-delà l'efficacité décroît. Une phytotoxicité passagère peut intervenir sans incidence significative sur le rendement.