

Produits utilisables contre les limaces

Spécialités commerciales	Substance active	kg/ha (conseil ferme)	Appâts/m ²	Coût (€ HT/ha)	Nombre max d'applications	Classement
Substance active : métaldéhyde						
TECHN'O Intens (1)	2,5 %	3 à 5	21-35	13-22	4	Sc
ALLOWIN QUATRO (2)	4 %	2,5 à 5	20-40	11-22	4	Sc
CARAKOL BLUE (3)	5 %	5	26	17	2	Danger H318
CLARTEX NEO, XENON PRO (4)	4 %	2,5 à 5	15-30	11-22	4	Sc
COPALIM SR (5)	5 %	4 à 7	24-42	12-21	2	Sc
DELICIA LENTILLES ANTIMACES (6) (7)	3 %	3	33	19-20	2	Sc
EXTRALUGEC GRANULES TECHN'O (8)	5 %	3,75 à 5	27-36	15-21	2	Sc
GENESIS TECHN'O (8)	5 %	3 à 3,75	31-40	15-19	2	Sc
GUSTO 3 (9)	3 %	4 à 5	32-40	16-20	2	Danger H318
MAGISEM PROTEC (10) (11)	4 %	3 à 4	33-44	16-21	1	Sc
METAPADS (12) (7)	3 %	4	35	16	2	Sc
METAREX INO (13)	4 %	2,5 à 5	15-30	11-22	4	Sc
MOLLUSTOP 3% (14) (7)	3 %	4	30	14-15	2	Sc
Substance active : phosphate ferrique						
FERREX (15) (16)	2,50 % (-)	6	60-66	25	5	Sc
IRONCLAD (15) (17)	2,96 % ***	7			4	Sc
IRONMAX MG (11) (15) (18)	2,42 % **	3 à 7	33-77	17-39	1	Sc
IRONMAX PRO (15)	2,42 % **	4 à 7	24-42	19-34	4	Sc
SEEDMIXX (11) (15)	2,97 % *	4	56	20	4	Sc
SLUXX HP (15) (19)	2,97 % *	5 à 7	43-60	22-31	4	Sc
Substance active : métaldéhyde + phosphate ferrique						
METAREX DUO (20)	1% + 1,62 % (-)	3 à 5	18 -30	15-25	5	Sc

Mise à jour en décembre 2020

Forme phosphate ferrique : (*) hydraté ; (**) anhydre ; (***) dihydrate ; (-) non précisé ZNT eau (zone non traitée) des spécialités commerciales : consultez les étiquettes

Sc : sans classement

La qualité d'un antilimaces ne dépend pas seulement de la substance active mais également de la tenue à la pluie, de l'absence de poussière, de la régularité de la taille, de l'attractivité et de l'appétence pour les limaces. Les antilimaces homologués récemment ne sont en général autorisés que sur certaines cultures avec des stades d'application, des doses maximales, un nombre de passages, un délai entre deux applications...

Un antilimace est un produit phytopharmaceutique dont l'application doit être gérée avec autant de soins qu'une application par pulvérisation. Lire attentivement les étiquettes et la documentation disponible auprès des distributeurs.

De nouveaux distributeurs centrifuges sont disponibles ; ils permettent de réaliser des applications plus précises (dose, répartition) et sont équipés d'un dispositif spécial pour une application en bordure de cours d'eau en toute sécurité.

Produits généralement formulés avec des répulsifs et/ou amersants visant à limiter, entre autres, les risques de consommation par les animaux domestiques.

Source : E-phy Anses, Phytodata, firmes.

(1) Autre spécialité : Metarex One. Application au plus tard au stade BBCH17 (7 feuilles). Dans la raie de semis au moment du semis ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha.

(2) Equivalant à Agrilimace Evo ; en plein avant BBCH17 (7 feuilles) ou dans la raie de semis ou en mélange à la semence.

(3) Autres spécialités : Warrior Blue, Helitox B, Limarion B, Metalixon Blue, Skaelim Blue ; minimum 7 jours entre 2 applications ; avant BBCH 19 (9 feuilles).

(4) Application au plus tard au stade BBCH17. Dans la raie du semis, au moment du semis ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha max ou en plein à la dose de 5 kg/ha max.

(5) Semis à 6 feuilles. Minimum 7 jours entre 2 applications. Autres spécialités concernées : Primedic SR, Semalim SR, Tradijalimaces.

(6) Autre spécialité forme lentille : Metadisque.

(7) Retrait au 19/06/20. Fin de distribution au 19/12/20 et fin d'utilisation au 19/06/21.

(8) Semis à 6 feuilles. Minimum 7 jours entre 2 applications.

(9) Autres spécialités : Balesta, Opposum, Surikate, Taste ; minimum 7 jours entre 2 applications ; avant BBCH19 (9 feuilles).

(10) Autre spécialité : Elirex 110.

(11) Préconisé en application au semis avec micro-granulateur ou en mélange avec les semences.

(12) Forme coussin.

(13) Application au plus tard au stade BBCH17 (7 feuilles) ; autres spécialités : Affut Tech, Helimax Pro. Dans la raie de semis au moment du semis ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha.

(14) Autres spécialités forme cylindre : Limadisque, Contre Limaces 3 %.

(15) Produit utilisable en agriculture biologique.

(16) Autres spécialités : Limafer, Turbopads, Turbodisque. 7 jours minimum pendant ou après les applications. Stade d'application : dès le début de l'infestation, avant, pendant ou après le semis, en plein sur la parcelle traitée. Sur maïs et tournesol, application dans la raie de semis.

(17) Minimum 7 jours entre 2 applications.

(18) Autre spécialité Musica.

(19) Autre spécialité Baboxx.

(20) Forme sphérique ; autre spécialité Helexiom Duo. Avant BBCH 17 (7 feuilles). Minimum 5 jours entre 2 applications.

