Soja - Tableaux efficacités des programmes sur dicotylédones et sur graminées & spécialités commerciales / matières actives - Mai 2025

www.terresinovia.fr

Post-semis prélevée	Post-levée (3-4 feuilles vraies du soja)	Coût des produits (€/ha)	Groupe HRAC	Graminées: Digitaire sanguine	Graminées: Panic pied de coq	Graminées: Sétaire	Graminées: Sorgho d'Alep	Dicotylédones: Amarante	Dicotylédones: Ambroisie à feuille d'armoise	Dicotylédones: Ammi majus	Dicotylédones: Bident tripartite	Dicotylédones: Chénopode	Dicotylédones: Colza (repousses)	Dicotylédones: Datura	Dicotylédones: Laiteron	Dicotylédones: Lampourde (xanthium)	Dicotylédones: Liseron des champs	Dicotylédones: Liseron des haies	Dicotylédones: Matricaire	Dicotylédones: Morelle	Dicotylédones: Moutarde des champs	Dicotylédones: Ravenelle	Dicotylédones: Renouée liseron	Dicotylédones: Renouée persicaire	Dicotylédones: Renouée à feuilles de patience	Dicotylédones: Renouée des oiseaux	Dicotylédones: Séneçon	Dicotylédones: Tournesol (repousses)
SUCCESSOR 600 1,5 l/ha + PROMAN 1,5 l/ha (1)		89	15 + 5							*																-	*	
BISMARK CS 2 l/ha		63	3 + 13											*					*	*	*	*	*	*	*	*	*	
PROWL 400 1,5 à 2 l/ha ou ATIC-AQUA 1,4 à 1,8 l/ha (2)	PULSAR 40 1 l/ha (3) DAVAÏ 0,5 à 0,65 l/ha (3)	68-78	3 + 2							*									*								*	(6)
SUCCESSOR 600 1,5 l/ha	PULSAR 40 1 l/ha (3) DAVAÏ 0,5 à 0,65 l/ha (3)	72-85	15 + 2																*						*		*	(6)
PROMAN 1,5 l/ha (1)	PULSAR 40 0,8 l/ha + Actirob B (3) DAVAÏ 0,4 l/ha + Actirob B (3)	83-93	5 + 2						(7)	*					*												*	(6)
	PULSAR 40 1 l/ha (3) ; DAVAÏ 0,5 à 0,65 l/ha (3)	35-48	2							*															*		*	(6)
	2 x PULSAR 40 ou DAVAÏ à demi-dose + Actirob B	52-76	2						(7)	*(5)					(5)				*(5)				(5)		*		*	(6)
	CORUM 1,25 l/ha + Dash HC ou Actirob B (4)	80	2 + 6					*	-	*	*		*	*			*							*	*	-	*	*	(6)
	BASAGRAN SG 1,1 kg/ha	82	6							-	-																	*	(8)
	Antigraminée foliaire	30	1																										

Efficacité bonne et régulière
Efficacité insuffisante
Efficacité moyenne ou irrégulière
- Références Terres Inovia insuffisantes
* à confirmer

(1) PROMAN/INIGO. Attention : pour les sols inférieurs à 15 % d'argile, PROMAN est déconseillé. Pour les sols supérieur à 15 % d'argile, la dose est recommandée est à 1,5 l/ha (usage déconseillé dans le cas contraire). A partir de 25 % d'argile, la dose peut être de 2 ou 2,5 l/ha. En situation à forte pression renouée liseron, préférez un programme ATIC-AQUA 2 + PROMAN 1,5.
(2) Autre herbicide similaire à PROWL 400 : BAROUD SC. Ces produits sont déconseillés en sols filtrants.
(3) L'application peut occasionner un tassement de la culture, voire une légère décoloration, durant 2 semaines. Veillez au bon rinçage du pulvérisateur avant l'application herbicide. En application fractionnée, anticipez le premier passage à 2-3 feuilles vraies du soja. Les efficacités sont données pour un stade jeune de l'adventice (2-4 feuille maxi).
(4) Dash HC peut être fourni en pack, sinon utilisez Actirob B à 1 l/ha.
(5) L'efficacité est améliorée par le fractionnement sans pour autant changer de classement.
(6) Repousses de tournesol non Clearfield et non ExpressSun.
(7) Voir la stratégie la mieux adaptée dans le chapitre ambroisie : fractionnement de la pleine dose de PULSAR 40 (avec Actirob B), programme avec BASAGRAN SG ou avec PROMAN.
(8) Au stade strict 2 feuilles.

Spécialités commerciales	Substances actives	Dose d'AMM (règlementaire)	Mention d'avertissement	Mentions de danger (règlement CLP)	DAR (jours ou stade)	ZNT	DVP
ATIC-AQUA	pendiméthaline 455 g/l	2 l/ha	ATTENTION	H317-H361d-H400-H410	BBCH09 (prélevée)	50 m	20 m
BASAGRAN SG	bentazone 87 %	1,1 kg/ha (1)	DANGER	H302-H317-H318	BBCH19	5 m	-
BISMARK CS	pendiméthaline 275 g/l + clomazone 55 g/l	2,5 l/ha	ATTENTION	H319-H361d-H411	BBCH07 (prélevée)	20 m	20 m
CENTIUM 36 CS	clomazone 360 g/l	0,4 l/ha	-	H413	-	5 m	-
CORUM	imazamox 22,4 g/l + bentazone 480 g/l	1,25 l/ha	ATTENTION	H302-H361d-H400-H410	BBCH25	5 m	-
DAVAÏ/SALTUS	imazamox 80 g/l	0,65 l/ha (2)	ATTENTION	H319-H332-H361d-H400-H410	BBCH14	5 m	-
PROWL 400/BAROUD SC	pendiméthaline 400 g/l	2,3 l/ha	ATTENTION	H361d-H400-H410	BBCH07 (prélevée)	50 m	20 m
PROMAN/INIGO/SOLETO	métobromuron 500 g/l	3 l/ha	ATTENTION	H351-H373-H400-H410	BBCH08 (prélevée)	5 m	-
PULSAR 40/LISTEGO	imazamox 40 g/l	1,25 l/ha (2)	ATTENTION	H361d-H400-H410	90	5 m	-
SUCCESSOR 600	péthoxamide 600 g/l	2 l/ha	DANGER	H302-H304-H315-H317-H319-H400-H410	BBCH08 (prélevée)	5 m	-

(1) Fractionnement possible en 2 applications à dose maximale de 0,55 kg/ha par application. Délai minimum entre applications de 7 jours.
(2) Fractionnement possible.

Anti-graminées

Spécialités efficaces contre digitaire, panic pied-de-coq, panic faux-millet, sétaire. Sur vivaces (sorgho d'Alep et chiendent), adaptez la dose (étiquette).

Spécialités commerciales	Substances actives	Dose d'AMM (règlementaire)	Dose pratique (graminées annuelles)	Mention d'avertissement	Mentions de danger (règlement CLP)	DAR (jours ou stade)	Coût des produit (€ HT/ha)
AGIL/CLAXON	propaquizafop 100 g/l	1,2 l/ha (annuelles); 2 l/ha (vivaces)	0,5 à 0,6 l/ha + huile 1 l/ha	DANGER	H304-H319-H411	90 j	23-27
ETAMINE	quizalofop-p-éthyle 50 g/l	1,2 l/ha	1,2 l/ha	ATTENTION	H317-H319-H411	90 j	39
FUSILADE MAX	fluazifop-p-butyl 125 g/l	1,5 l/ha	1,2 l/ha	ATTENTION	H361d-H400-H410	90 j	33
LEOPARD 120	quizalofop-p-éthyle 120 g/l	1,25 l/ha	0,5 l/ha + huile 1 l/ha	DANGER	H304-H3017-H319-H410	90 j	30
PILOT	quizalofop-p-éthyle 50 g/l	1,2 l/ha (annuelles) ; 3 l/ha (vivaces)	1,2 l/ha	DANGER	H304-H317-H318-H332-H410	90 j	32
STRATOS ULTRA	cycloxydime 100 g/l	2 l/ha (annuelles) ou 4 l/ha (vivaces)	1,2 l/ha + Dash HC 1,2 l/ha	DANGER	H304-H315-H319-H336-H361d-H411	100 j	32

AMM : autorisation de mise sur le marché.
CLP : classification labelling packaging.
DAR : délais avant récolte.
ZNT aquatique : zone non traitée de 5 m par défaut sauf pour Atic-Aqua/Prowl 400/Baroud SC : 20 m.
DVP : dispositif végétalisé permanent.

Application des herbicides : respectez le stade



Exemples de stratégies selon la flore adventice attendue sur la parcelle et le type de sol

Situation	Flore visée	Stratégies de désherbage: Prélevée	Post-levée: Intervention 1	Post-levée: Intervention 2
Cas général dont rotations avec maïs	Flore estivale diverse (1) + renouée liseron et chénopode	Atic-Aqua (2) + Proman (3) ou Proman (3) ou Bismark	Corum + Dash HC ou Pulsar 40 ou Davaï	Binage (si nécessaire)
Forte pression des adventices	Flore estivale diverse (1) + matricaire, séneçon, laiteron, liseron des haies	Successor 600	Corum + Dash HC	
	Flore estivale diverse (1) + ambroisie	Successor 600 ou Successor + Proman ou Proman (3)	Pulsar 40 0,625 l/ha + Actirob B (4)	Pulsar 40 0,625 l/ha + Actirob B
Pulsar 40 et Davaï sont seuls efficaces sur datura et xanthium	Dominante graminées dont sorgho d'Alep, chiendent	Atic-Aqua (2) ou Successor 600	Pulsar 40 ou Davaï	Antigraminée foliaire (dose vivace)
Rotation céréalière Faible pression des adventices	Flore estivale diverse (1)	Atic-Aqua (2)	Binage ou Pulsar 40 ou Davaï	
		Proman (3) Bismark Successor 600	Si nécessaire : binage ou Pulsar 40 0,8 l/ha ou Davaï 0,5 l/ha + Actirob B 1 l/ha	
	Flore estivale (1) modérée sans chénopode ni renouée liseron		Pulsar 40 ou Davaï	Binage (si nécessaire)

(1) Amarante, morelle, renouée persicaire, chénopode et renouée liseron en faible pression, etc.
(2) Dose : de 1,4 l/ha en sols filtrants ou en limons à 1,8 l/ha
(3) Uniquement si le sol est supérieur à 15 % d'argile. Sinon, le produit est déconseillé.
(4) Etre vigilant sur le stade d'application du Pulsar 40. Démarrer la première application dès 2-3 feuilles vraies du soja.