






Spécialité commerciale	Second nom commercial et génériques (2)	substances actives	Usage Graines protéagineuses-TPA*			Nombre d'application max	DAR	ZNT aquatique	DVP	Coût (€ HT/ha) RPD incluse	Mention d'avertissement (règlement CLP)	Mentions de danger (règlement CLP)	Délai de rentrée (DRE en heures)
			*Pourriture grise et sclérotiniose	*anthracnose	*rouille								
			Botrytis-sclérotinia	anthracnose	rouille								
AMISTAR	ORTIVA GOLD, ZOXIS, AZOXYSTAR	azoxystrobine 250 g/l	0,8	0,8	1	2 (3) (5)	35	5	5 m	22-27	attention	H400, H410	6
PROSARO	PIANO	prothioconazole 125 g/l + tébuconazole 125 g/l		1 (1)	1 (1)	2 (3)	35	5	-	54	attention	H315, H319, H361d, H410	6
SCALA	TOUCAN	pyriméthanil 400 g/l	1,5 (1)	1,5 (1)		2	28	5	-	52	attention	H412	6
SUNORG PRO	CARAMBA STAR, METCOSTAR90	métconazole 90 g/l	0,8	0,8	0,8	2	20	5	-	24-25	attention	H319-H361d-H373-H411	24
ZAKEO XTRA	AZERTY XTRA	azoxystrobine 200 g/l + cyproconazole 80 g/l	1	1	1	2 (4)	35	5	5 (4)	46	attention	H302, H332, H361d, H410	6

	Bonne efficacité
	Efficacité moyenne
	Efficacité insuffisante
	Manque de référence
	Non homologué pour cet usage

La réglementation sur les produits phytosanitaires évolue (retraits, délai de commercialisation, etc...). Pour en savoir plus, consulter www.terresinovia.fr

AMM : Autorisation de mise sur le marché.

Règlement CLP (Classification labelling packaging) : règlement européen qui met en oeuvre les recommandations internationales du SGH (Système général harmonisé).

Avant tout mélange s'assurer du respect de la réglementation.

(1) Homologué pour cet usage via le nouveau catalogue des usages. La firme ne couvre pas cette utilisation qui ne peut se faire que sous la responsabilité de l'utilisateur.

(2) Il existe d'autres produits génériques. Lisez attentivement l'étiquette car les données réglementaires peuvent être différentes (AMM, mentions de danger, etc..).

(3) Respecter un délai minimum de 14 jours entre deux applications.

(4) Applicable à partir des premiers boutons floraux. Respecter un intervalle de 21 jours entre 2 applications. DVP de 5 m uniquement si 2 applications.

(5) Une seule application par an pour sols drainés (>45 % d'argile).