

Comment utiliser le Challenge 600 en pré et en post-levée

	Culture	BBCH min	BBCH max	Dose /ha	Nb max. appli.	ZNT	DVP	MAJ
Prélevée	HIVER Pois, féverole	-	08	3 l	1	50 m	20 m	23/12/15
	PRINTEMPS Pois, féverole, lupin	-	08	4 l	1	20 m	20 m	
Post-levée	Pois hiver et printemps	12	18	0,5 l	1	20 m	20 m	30/06/16

BBCH 08 : la pousse se dirige vers la surface de sol - BBCH 12 : 2 feuilles - BBCH 18 : 8 feuilles



Post-levée :

- une application en post-levée à la dose réduite de 0,5 l/ha est possible **uniquement** en l'absence d'application en prélevée.
- Challenge 600 peut être appliqué en une ou deux applications. Exemple :

challenge 600 0,25 l/ha + Basagran SG 0,15 kg/ha renouvelé 10-15 jours plus tard.

Terres Inovia s'engage à conseiller ce type de fractionnement pour la raison suivante :

- les restrictions de fractionnement ont été mises en place dans le cadre de la gestion des inhibiteurs de l'ALS face au risque de développement de la résistance sur graminées. Dans la quasi-totalité des AMM des antigraminées foliaires à base d'inhibiteurs de l'ALS, cette restriction est mentionnée ;
- en dehors de cette restriction, la possibilité de fractionner une pleine dose a déjà été confirmée à deux reprises par le bureau de la réglementation de la DGAL (mars 2011 et novembre 2015). Cette pratique est valable tant qu'elle ne sort pas du cadre de l'évaluation aboutissant à l'AMM (c'est-à-dire, un fractionnement dans une même période d'application. Exemple : application fractionnée à 10-15 jours d'intervalle) ;
- le nombre maximal d'applications défini par l'ANSES sur l'AMM sert à encadrer la dose maximale d'application (soit 1 fois 0,5 l/ha). Si le nombre d'application maximal était de 2, la dose totale autorisée serait de $2 \times 0,5$ l/ha, ce qui n'est pas le cas.