

Spécialités commerciales	Substances actives	Dose d'AMM	Nombre max d'application	Mention d'avertissement	Mentions de danger (règlement CLP)	DAR (jours ou stade)	ZNT	DVP
AGIL/CLAXON/AMBITION	propaquizafop 100 g/l	1,2 l/ha (annuelles) 2 l/ha (vivaces)	1	Danger	H304-H319-H411	50 j	5 m	-
AVADEX 480	triallate 480 g/l	3 l/ha	1	Danger	H302-H304-H317-H319-H373-H410	3j	5 m	-
BALISTIK/FOLY R/NOROIT (3) Pois de printemps uniquement	cléthodime 120 g/l	1 l/ha	1	Danger	H304-H336-H411	60 j	5 m	-
BASAGRAN SG (6) Pois de printemps uniquement	bentazone 87 %	1,1 kg/ha	1 fractionnable en 2 applications	Danger	H302-H317-H318	42 j	5 m	-
BISMARCK CS (5)	pendiméthaline 275 g/l + clomazone 55 g/l	2 l/ha application de mars à novembre	1	Attention	H317-H319-H411	BBCH 07 (prélevée)	20 m	-
BONALAN (7)	benfluraline	6 l/ha	1	Danger	H226-H304-H315-H317-H319-H332-H351-H400-H410	-	50 m	-
CENTURION 240EC/OGIVE VXT (3) Pois de printemps uniquement	cléthodime 240 g/l	0,5 l/ha	1	Danger	H304-H317-H336-H411	60 j	20 m	-
CENTIUM 36 CS	clomazone 360 g/l	0,25 l/ha	1	-	H413	-	5 m	-
CHALLENGE 600/CHANON	aclonifen 600 g/l	3 l/ha pois d'hiver 4 l/ha pois de printemps	1	Attention	H351-H410	BBCH08 (prélevée)	50 m (hiver) 20 m (printemps)	20 m
		0,5 l/ha en postlevée sans prélevée préalable				BBCH 18 (8 F)	20 m	20 m
COLT/PAPEL	aclonifen 600 g/l	4,5 l/ha prélevée 3 l/ha prélevée puis 0,5 l/ha postlevée	1 fractionnable en 2 applications	Attention	H317-H351-H400-H410	BBCH 16 (6 F)	20 m	20 m
		0,5 l/ha en postlevée sans prélevée préalable					5 m	5 m
CORUM	imazamax 22,5 g/l + bentazone 480 g/l	1,25 l	1	Attention	H302-H400-H410	BBCH25 (5 pousses latérales)	5 m	-
ETAMINE	quizalofop-p-éthyl 50 g/l	1,2 l/ha (annuelles) 3 l/ha (vivaces)	1	Attention	H317-H319-H411	45 j	5 m	-
FUSILADE MAX	fluazifop-p-butyl 125 g/l	1,5 l/ha (annuelle) 2,5 l/ha (vivaces)	1	Attention	H361d-H400-H410	90	5 m	-
KERB FLO (1)	propyzamide 400 g/l	1,87 l/ha	1	Attention	H351-H410	BBCH14	5 m	-
LENTAGRAN	pyridate 450 g/kg	1 kg/ha	1 fractionnable en 2 * 0,5kg/ha	Attention	H317-H400-H410	45j	20 m	5 m
NIRVANA S	imazamax 16,5 g/l + pendiméthaline 250 g/l	Prélevée : 4,5 l/ha Postlevée : 2 l/ha	1/2 ans 1 en postlevée	Attention	H315-H317-H400-H410	63 j	20 m	-
PILOT	quizalofop-p-éthyl 50 g/l	1,2 l/ha (annuelles), 3 l/ha (vivaces)	1	Danger	H304-H317-H318-H332-H410	45 j	5 m	-
PROWL 400/ BAROUD SC/PENTIUM FLO	pendiméthaline 400 g/l	3 l/ha	-	Attention	H400-H410 (H400-H401-H410 = Baroud)	63 j	20 m	-
STALLION SYNC Pois de printemps uniquement	clomazone 30 g/l + pendiméthaline 333 g/l	3 l/ha	1	Attention	H410	BBCH09 (levée)	20 m	20 m
STRATOS ULTRA (2)	cycloxydime 100 g/l	2 l/ha (annuelles), 4 l/ha (vivaces)	1 (4)	Danger	H304-H315-H319-H336-H361d-H411	56 j	5 m	-
TARGA MAX	quizalofop-p-éthyl 100 g/l	1,5 l/ha	1	Danger	H302-H304-H318-H411	45 j	5 m	-
TOUTATIS DAMTEC	aclonifen 500g/kg + clomazone 30 g/kg	2,4 kg/ha	1	Attention	H315-351-H410	BBCH08 (prélevée)	20 m	20 m
TROPOTONE	2,4 mcpb 400 g/l	4 l/ha	-	Danger	H302-H315-H318	60 j	5 m	-
VESUVE MAX (4) Pois de printemps uniquement	quizalofop-d-éthyl 70 g/l + cléthodime 140 g/l	0,8 l/ha	1 (4)	Danger	H304-H315-H317-H336-H410	60 j	5 m	-

(1) Autres spécialités : Setanta Flo, Redoutable Plus.

(2) Respecter un délai de 3 ans pour appliquer à nouveau Stratos Ultra après une application d'hiver (pois, féverole, colza).

(3) Uniquement sur pois et féverole de printemps. Pas d'AMM sur culture d'hiver. D'autres spécialités existent : Select ou Exocet, trade mark de Centurion.

(4) Pois de printemps à destination de l'alimentation animale ou production de semences uniquement.

(5) Application de mars à novembre uniquement.

(6) Spe 1 : pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la bentazone en automne et en hiver.

(7) Non réapprouvé. Fin d'utilisation probable en mai 2024.

CLP : Classification labelling packaging

DAR : délai avant récolte

ZNT : Zone non traitée

DVP : Dispositif végétal permanent