

# Pois d'hiver et pois de printemps : exemples de programmes les plus adaptés Mai 2023 www.terresinovia.fr

	Adventices	Prélevée	Post-levée	Coût indicatif (€/ha)
<b>Prélevée seule</b> Infestation faible à modérée, sols hydromorphes (passage de post-levée pas toujours possible en sortie hiver). Pois d'hiver : très faible contrôle des levées printanières.	Capselle, coquelicot, chénopode, pensée, stellaire. Moyen sur fumeterre et renouée.	PROWL 400 3 l (1)		39
	+ éthuse, ammi-majus et gaillet. Léger renfort renouées.	PROWL 400 3 l (1) + CENTIUM 36CS 0,2 l		63
	Ammi-majus, éthuse, gaillet, renouée des oiseaux, chénopode, matricaire, véronique de perse, capselle, stellaire, laitiron	TOUTATIS DAMTEC 2.4 kg		71-85
		CHALLENGE 600 ou COLT 2 l + CENTIUM 36 CS 0,2 l		
	+ coquelicot, crucifères, morelle	NIRVANA S 2,5-3 l + CENTIUM 36 CS 0,15 l		
	+ renfort renouée liseron et fumeterre (pression modérée)	BISMARK (5) 1,6 l + CHALLENGE 600 ou COLT 1,6 l		74-88
		NIRVANA 3,5-4 l		
	Spectre large et/ou renfort sur la sortie hiver	CHALLENGE 600 ou COLT 2,5 l + PROWL 400 1,5 l (1)		95
CHALLENGE 600 ou COLT à 2 l + NIRVANA S 2 l			102	
Avec meilleur effet gaillet et mercuriale	CHALLENGE 600 ou COLT 2 l + NIRVANA S 2 l + CENTIUM 36 CS 0,15 l		120	
<b>Prélevée puis post-levée</b> Infestation forte à très forte. Contrôle des levées printanières (renouées, etc.)	Crucifères, coquelicot, chénopodes, gaillet, matricaire, renouées, véronique de Perse, laitiron	COLT 2 l	COLT 0,25 à 0,5 l + BASAGRAN SG (4) 0,15 à 0,3 kg selon la pression OU COLT 0,25 à 0,5 l + CORUM 0,3 à 0,5 l + adjuvant en 1 ou fractionné en 2 passages (2)	77-93
		NIRVANA S 2 à 2,5 l	COLT 0,25 à 0,5 l + BASAGRAN SG (4) 0,15 à 0,3 kg selon la pression OU COLT 0,25 à 0,5 l + CORUM 0,3 à 0,5 l + adjuvant en 1 ou fractionné en 2 passages (2)	58-90
	+ ammi-majus, éthuse	TOUTATIS 2 kg ou BISMARK (5) 1,5 l + COLT 1,5 l	COLT 0,25 à 0,5 l + BASAGRAN SG (4) 0,15 à 0,3 kg selon la pression OU COLT 0,25 à 0,5 l + CORUM 0,3 à 0,5 l + adjuvant en 1 ou fractionné en 2 passages (2)	98-130
	Crucifères, coquelicot, chénopodes, stellaire, gaillet, matricaire, pensée, renouées (efficacité moyenne en pois d'hiver), véronique de Perse, laitiron	PROWL 400 2,5 à 3 l (1)	COLT 0,5 l + BASAGRAN SG (4) 0,3 kg en 1 ou fractionné en 2 passages (2) OU COLT 0,5 l + CORUM 0,5 l + adjuvant en 1 ou fractionné en 2 passages (2)	56-87
<b>Post-levée seule</b> Infestation moyenne. Contrôle des levées printanières (chénopodes, renouées, etc.)	Éthuse, fumeterre, matricaire, renouées (insuffisant sur renouée liseron et renouée des oiseaux), crucifères		CORUM 1 l + adjuvant (3)	67
			CORUM 0,6 l + adjuvant (3) x 2 passages (2)	80
	Crucifères, éthuse, fumeterre, chénopode, stellaire, matricaire, renouée (insuffisant sur renouée des oiseaux), pensée, véroniques. Moyen sur ammi-majus, coquelicot et laitiron.		BASAGRAN SG (4) 0,6 kg + PROWL 400 1 l (1) OU CORUM 0,8 à 1 l + adjuvant + PROWL 400 0,6 à 1 l (1)	51-80
			BASAGRAN SG (4) 0,3 kg + PROWL 400 0,5 l (1) x 2 passages (2) OU CORUM 0,6 l/ha + adjuvant + PROWL 400 0,6 l (1) x 2 passages (2)	
	+ gaillet et renfort coquelicot. Insuffisant sur renouée liseron, renouée des oiseaux, éthuse et ammi-majus.		COLT 0,25 l + BASAGRAN SG (4) 0,15 kg x 2 passages (2) OU COLT 0,25 l + CORUM 0,25 l + adjuvant x 2 passages (2)	34-50
			CHALLENGE 600 ou COLT 0,5 l + BASAGRAN SG (4) 0,3 kg OU CHALLENGE 600 ou COLT 0,5 l + CORUM 0,5 l + adjuvant	
	Bleuet voire chrysanthème, efficacité moyenne attendue		BASAGRAN SG (4) 1,1 kg OU CORUM 1,25 l + adjuvant	70-84
Chardon des champs		TROPOTONE 3 l (traiter par tache pour raison de sélectivité)	73	

(1) Ou BAROUD SC ou PENTIUM FLO

(2) 2 passages à 8-10 jours (pois de printemps) ou 10-15 jours (pois d'hiver) d'intervalle, pour améliorer l'efficacité à condition de débiter les applications sur adventices de cotylédons à deux feuilles.

(3) DASH HC ou ACTIROB B

(4) BASAGRAN SG : uniquement sur pois de printemps. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la bentazone en automne et en hiver.

(5) Application de mars à novembre uniquement.

N.B. : en l'absence d'application d'aclonifen en prélevée, CHALLENGE 600 peut être appliqué en post-levée.