

Spécialités commerciales	Substances actives	Dose d'AMM	Nombre max d'application	Mention d'avertissement	Mentions de danger (règlement CLP)	DAR (jours ou stade)	ZNT	DVP
AGIL/CLAXON/AMBITION	propaquizafop 100 g/l	1,2 l/ha (annuelles) 2 l/ha (vivaces)	1	DANGER	H304-H319-H411	50 j	5 m	-
AVADEx 480	trilalate 480 g/l	3 l/ha	1	DANGER	H302-H304-H317-H319-H373-H410	3j	5 m	-
BASAGRAN SG	bentazone 87%	1,4 kg/ha	1	DANGER	H302-H317-H318	42 j	5 m	-
BONALAN	benfluraline	6 l/ha	1	DANGER	H226-H304-H315-H317-H319-H332-H351-H400-H410	-	50 m	-
CENTURION 240EC/OGIVE VXT (3)	cléthodime 240 g/l	pois de printemps uniquement 0,5 l/ha	1	DANGER	H304-H317-H336-H411	60 j	20 m	-
CENTIUM 36 CS	clomazone 360 g/l	0,25 l/ha	1	-	H413	-	5 m	-
CHALLENGE 600/CHANON	aclonifen 600 g/l	3 l/ha pois d'hiver 4 l/ha pois de printemps	1	ATTENTION	H351-H410	BBCH08 (prélevée)	50 m (hiver) 20 m (printemps)	20 m
		0,5 l/ha en postlevée sans prélevée préalable	1			CBBCH 18 (8 F)	20 m	20 m
COLT/PAPEL	aclonifen 600 g/l	4,5 l/ha prélevée 3 l/ha prélevée puis 0,5 l/ha postlevée	1 fractionnable en 2 applications	ATTENTION	H317-H351-H400-H410	BBCH 16 (6 F)	20 m	20 m
		0,5 l/ha en postlevée sans prélevée préalable	1 fractionnable en 2 applications					
CORUM	imazamox 22,5 g/l + bentazone 480 g/l	1,25 l	1	ATTENTION	H302-H400-H410	BBCH25 (5 pousses latérales)	5 m	-
ETAMINE	quizalofop-p-éthyl 50 g/l	1,2 l/ha (annuelles) 3 l/ha (vivaces)	1	ATTENTION	H317-H319-H411	45 j	5 m	-
BALISTIK/FOLY R/NOROIT (3)	cléthodime 120 g/l	pois de printemps uniquement 1 l/ha	1	DANGER	H304-H336-H411	60 j	5 m	-
FUSILADE MAX	fluazifop-p-butyl 125 g/l	1,5 l/ha (annuelle) 2,5 l/ha (vivaces)	1	ATTENTION	H361d-H400-H410	90	5 m	-
KERB FLO (1)	propyzamide 400 g/l	1,87 l/ha	1	ATTENTION	H351-H410	BBCH14	5 m	-
NIRVANA S	imazamox 16,5 g/l + pendiméthaline 250 g/l	Prélevée : 4,5 l/ha Postlevée : 2 l/ha	1 / 2 ans 1 en postlevée	ATTENTION	H315-H317-H400-H410	63 j	20 m	-
PILOT	quizalofop-p-éthyl 50 g/l	1,2 l/ha (annuelles), 3 l/ha (vivaces)	1	DANGER	H304-H317-H318-H332-H410	45 j	5 m	-
PROWL 400/BAROUD SC/PENTIUM FLO	pendiméthaline 400 g/l	3 l/ha	-	ATTENTION	H400-H410 (H400-H401-H410 = Baroud)	63 j	20 m	-
STALLION SYNC TEC	clomazone 30 g/l + pendiméthaline 333 g/l	3 l/ha Pois de printemps uniquement	1	ATTENTION	H410	BBCH09 (levée)	20 m	20 m
STRATOS ULTRA (2)	cycloxydime 100 g/l	2 l/ha (annuelles), 4 l/ha (vivaces)	1 (4)	DANGER	H304-H315-H319-H336-H361d-H411	56 j	5 m	-
TARGA MAX	quizalofop-p-éthyl 100 g/l	1,5 l/ha	1	DANGER	H302-H304-H318-H411	45 j	5 m	-
TOUTATIS DAMTEC	aclonifen 500g/kg + clomazone 30 g/kg	2,4 kg/ha	1	ATTENTION	H315-351-H410	BBCH08 (prélevée)	20 m	20 m
TROPOTONE	2,4 mcpb 400 g/l	4 l/ha	-	DANGER	H302-H315-H318	60 j	5 m	-
VESUVE MAX (4)	quizalofop-d-éthyl 70 g/l + cléthodime 140 g/l	Pois de printemps uniquement 0,8l/ha. Destination alimentation animale	1	DANGER	H304-H315-H317-H336-H410	60 j	5 m	-

(1) Autres spécialités : SETANTA FLO, REDOUTABLE PLUS

(2) Respecter un délai de 3 ans pour appliquer à nouveau STRATOS ULTRA après une application d'hiver (pois, féverole, colza)

(3) uniquement sur pois et féverole de printemps. Pas d'AMM sur culture d'hiver. D'autres spécialités existent : SELECT ou EXOCET, trade mark de CENTURION

(4) cultures destinées à l'alimentation animale uniquement

CLP : classification labelling packaging

DAR : délai avant récolte