

	Dose/ha	Coût (€ HT/ha)	Groupe HRAC	Ammi-élevée	Arroche étalée	Chardon	Chénopode	Capselle	Repousses de colza	Coquelicot	Elhuse	Fumeterre	Gaillet	laite Iron	Matricaire	Mercuriale	Morelle	Moutarde	Ravenelle	Pensée	Renouée des oiseaux	Renouée liseron	Renouée persicaire	Stellaire	Repousses de Tournesol	Véronique de Perse	Véronique feuille de lierre
Prélevée	CHALLENGE 600 ou COLT (1)	3 l (hiver) à 4 l (printemps)	63-84	F3																							
	NIRVANA S	4 l	78	B + K1									*												(7)		
	CENTIUM 36 CS	0,2 à 0,25 l	28-35	F3									*														
	PROWL 400 (2)	3 l	36	K1																							
	STALLION SYNC TEC (Pois de printemps)	2,5 l	62	K1 + F3	-	-				*		*		-		*	*			*	*	*	*	*		-	-
	CHALLENGE 600 ou COLT + NIRVANA S	2+2 à 2+3	100	F3 + B + K1	-								*												(7)		
	TOUTATIS damtec	2,4 kg	70	F3									*														
	CHALLENGE 600 ou COLT + CENTIUM 36 CS	2 à 2,5 l + 0,2 l	70-80	F3									*														
	CHALLENGE 600 ou COLT + PROWL 400 (1)	3 l + 1,5 l	82	F3 + K1									*														
	NIRVANA S + CENTIUM 36 CS	2,5 à 3 l + 0,15 l	69-79	B + K1 + F3									*												(7)		
	CHALLENGE 600 ou COLT + NIRVANA S + CENTIUM 36 CS	2 l + 2 l + 0,15 l	102	B + K1 + F3									*												(7)		
	Post-levée	CHALLENGE 600 ou COLT + STALLION SYNC TEC	2 l + 2 l	91	K1 + F3	-	-			*	-	-	*		-	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	-
BASAGRAN SG (4)		1 à 1,4 kg	58 à 81	C3								*															
BASAGRAN SG (4) + PROWL 400 (2) (5)		0,6 kg + 1 l	47	C3+ K1								*															
CHALLENGE 600 ou COLT (1) + BASAGRAN SG (4)		0,5 l + 0,3 kg	28	F3 + C3																							
CORUM + DASH HC		0,8 à 1,25 l	54-85	B + C3																					(7)		
TROPTONE (6)	2,5 à 3,5 l	60	O	-	-																						

	Doses/ha en fonction du stade (8)	Coût (€ HT/ha)	Folle-avoine		Paturin annuel		Repousses de céréales		Ray-grass		Vulpin	
			(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Foliaires (13)	AGIL / CLAXON / AMBITION + huile (9)											
	CENTURION 240EC / SELECT + huile (9) (pois de printemps)											
	ETAMINE											
	BALISTIK / FOLY R (pois de printemps)											
	FUSILADE MAX											
	LEOPARD 120 + huile (9)				(10)							
	PILOT				(10)							
	STRATOS ULTRA + DASH HC											
	TARGA MAX				(10)							
	KERB FLO (11) sur pois d'hiver											
	AVADEX 480 (12)											

■ Bonne efficacité
■ Efficacité moyenne à satisfaisante
■ Efficacité moyenne
■ Efficacité moyenne à insuffisante
■ Efficacité insuffisante
 * Références peu nombreuses
 - Absence de références
 (a) Avant tallage
 (b) Tallage

(1) CHALLENGE 600 est homologué à 3 l/ha sur féverole et pois d'hiver et à 4 l/ha sur féverole et pois de printemps. COLT est homologué à 4,5 l/ha. CHALLENGE peut s'appliquer en postlevée à 0,5 l/ha sans fractionnement à condition de ne pas l'avoir appliqué, au préalable, en prélevée. COLT peut s'appliquer à 0,5 l/ha en postlevée en une application non fractionnable après une dose maximale de COLT à 3 l/ha. COLT peut être fractionnée en 2 x 0,25 l/ha en postlevée uniquement si absence d'application en prélevée.
 (2) Autres spécialités : BAROUD SC, PENTIUM FLO.
 (3) Absence de références sur la sélectivité en pois d'hiver. Application déconseillée. Retrait d'AMM.
 (4) Le mélange CHALLENGE + BASAGRAN n'est pas recommandé par les firmes. Son utilisation se fera sous la responsabilité de l'utilisateur mais les données Terres Inovia montre une parfaite sélectivité.
 (5) Ces doses peuvent être fractionnées en deux applications.
 (6) Pour des raisons de sélectivité, il est préférable de limiter cette application aux zones de chardons.
 (7) Repousses de tournesol non clearfield ou express Sun. Attention, sur repousses de tournesol Clearfield® ou Express Sun®, Corum reste très insuffisant. Il faut dans ce cas préférer Basagran SG 1,4 kg/ha sur repousses à 2 feuilles.
 (8) Sur vivaces, la dose peut être plus élevée. Consultez l'étiquette. Les doses les plus élevées concernent souvent le ray-grass.
 (9) Les huiles sont bien plus efficaces que les mouillants. Certaines firmes établissent une liste positive d'huile.
 (10) A dose vivace uniquement.
 (11) Applicable à 4-5 feuilles vraies de la féverole et du pois. Utilisation au printemps non compatible avec le DAR. Autres spécialités : ZAMMO, SETANTA FLO... Application précoce, sur adventices jeunes.
 (12) Applicable en pré-semis incorporé. L'efficacité est plus faible en conditions sèches (semis précoces fin septembre-début octobre). Efficacité donnée sur levée d'automne de folle-avoine.
 (14) Attendre le stade 3-4 feuilles des graminées adventices pour intervenir. Conditions d'application : désherbez par temps poussant avec une hygrométrie supérieure à 60 %. Evitez les fortes amplitudes thermiques (supérieures à 15°C).