

	10-12 feuilles	Début floraison	Début floraison + 15 jours	Fin floraison
Pois d'hiver Année à pression précoce	Chlorothalonil 750 g/ha + AMISTAR 0,3 l/ha ou Chlorothalonil 1000 g/ha ou AMISTAR 0,5 à 0,75 l/ha	PROSARO 0,75 l/ha ou AMISTAR 0,75 l/ha ou ZAKEO XTRAS 1 l/ha ou IBEX 0,6 l/ha	PROSARO 0,75 l/ha ou IBEX 0,6 l/ha ou AMISTAR 0,75 l/ha (3) ou SUNORG PRO 0,6 à 0,8 l/ha ou ZAKEO XTRA 0,75 l/ha	
Pois d'hiver Année à forte pression : printemps humide, pression rouille		Chlorothalonil 750 g/ha + AMISTAR 0,3 l/ha ou Chlotothalonil 1000 g/ha ou MAORI 1,5 à 2 l/ha ou IBEX 0,6 l/ha ou AMISTAR OPTI 2 l/ha ou AMISTAR 0,75 l/ha	CITADELLE (1) 1,75 l/ha (2) ou PROSARO 0,75 l/ha ou AMISTAR 0,75 l/ha ZAKEO XTRA 1 l/ha ou IBEX 0,6 l/ha	AMISTAR 0,75 l/ha (3) ou SUNORG PRO 0,6 à 0,8 l/ha
Pois d'hiver Année classique : pression moyenne Pois de printemps Année à forte pression : printemps humide		Chlorothalonil 750 g/ha + AMISTAR 0,3 l/ha ou Chlotothalonil 1000 g/ha ou MAORI 1,5 à 2 l/ha ou IBEX 0,6 l/ha ou AMISTAR OPTI 2 l/ha ou AMISTAR 0,75 l/ha	CITADELLE (1) 1,75 l/ha (2) ou PROSARO 0,75 l/ha ou AMISTAR 0,75 l/ha ZAKEO XTRA 1 l/ha ou IBEX 0,6 l/ha	
Pois d'hiver et de printemps Année à faible pression		Chlorothalonil 750 g/ha + AMISTAR 0,3 l/ha ou Chlotothalonil 1000 g/ha ou MAORI 1,5 à 2 l/ha ou IBEX 0,6 l/ha ou AMISTAR OPTI 2 l/ha ou AMISTAR 0,75 l/ha		

En rouge : produit avec retrait d'AMM en 2019. Utilisation possible avant le 20 mai 2020

(1) Produits équivalents : CITADELLE, BRAVO ELITE, MARATHON

(2) Sauf si programme avec BANKO 500, FONGIL FL ou AMISTAR OPTI appliqué en T1 (dose totale de chlorothalonil limitée à 1000 g/ha/an) ou avec MAORI (dose totale limitée à 750 g/ha/an) appliqué en T1.

Chlorothalonil : BANKO 500, CHLOROSTAR, DOJO, FONGI FL...

(3) AMISTAR est limité à 2 applications par an

Manque de référence sur la solution chlorothalonil 500 g/ha + AMISTAR 0,3 à 0,5 l/ha, PROSARO à 0,5 l/ha.