

		Doses/ha	Coût (€ HT/ha) RPD incluse	Ancien groupe HRAC	Nouveau groupe HRAC	Ammi-élevée	Arroche étalée	Chardon	Chénopode	Capselle	Repousses de colza	Coquelicot	Datura	Ethuse	Fumeterre	Gaillet	Laiteron	Matricaire	Mercuriale	Morelle	Moutarde	Ravenelle	Pensée	Renouée des oiseaux	Renouée liseron	Renouée persicaire	Séneçon	Stellaire	Repousses de Tour.	Véronique de Perse	Véronique feuille de lierre	
Spécialités antidicotylédones	Prélevée	CHALLENGE 600	3 l	76	F3	34																										
		NIRVANA S (1)	1,5 à 2 l	31 à 42	B + K1	2+3	-		*	*	*	*	*		-		*	*		*	*	*		*	*	*		*	(3)	*	*	
		PROWL 400	3 l	37	K1	3																										
		CHALLENGE 600 + NIRVANA S (1)	2 + 1,5 à 2 l	79-90	F3 + B + K1	34+2+3	-						*				*													(3)		
		CHALLENGE 600 + PROWL 400	3 l + 1,5 l	90	F3 + K1	34+3											*															
	Postlevée	CHALLENGE 600 (2)	0,5 l	12	F3	34				*	*	*	*		-		*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*
		LENTAGRAN (8)	2 kg fractionnable en 2x1 kg	100	C3	6	-			*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
		ONYX (8)	1,5 l	54	C3	6	-			*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
		ONYX + CHALLENGE 600 (7)(8)	1 l + 0,5 l	48	F3+C3	34+6	-	*		*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*

		Doses/ha en fonction du stade (4)		Coût (€ HT/ha) RPD incluse	Ancien groupe HRAC	Nouveau groupe HRAC	Folle-avoine		Paturin annuel		Repousses de céréales		Ray-grass		Vulpin		
		(a)	(b)				(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	
Spécialités antigraminées	Postlevée	CENTURION 240EC/OGIVE vxt + huile (5)	0,5 l	0,5 l	32	A	1										
		ETAMINE	0,8 à 1 l	1,2 l	27-40	A	1										
		FOLY R/BALISTIK	1 l	1 l	33	A	1										
		FUSILADE MAX	1 à 1,25 l	1,25 à 1,5 l	27-41	A	1										
		PILOT	1 l	1,2 l	29-37	A	1			(6)							
		STRATOS ULTRA + DASH HC	1 l	1,2 l	27-33	A	1										
		TARGA MAX	0,5 l	0,6 l	27-33	A	1			(6)							
	Prélevée	KERB FLO en prélevée	1,875 l	1,875 l	40-44	K1	3										

(1) Dose à moduler selon type de sol. La dose de 2 l/ha est à réserver aux sols argileux. Ne pas utiliser NIRVANA S sur sols sableux ou filtrants. Association non couverte par les firmes.
 (2) Challenge 600 peut être utilisé en postlevée à condition de n'avoir pas été appliqué en prélevée. Pour un programme, choisir PROWL ou NIRVANA en prélevée. Appliquez sur très jeune adventice (maxi 2 feuilles).
 (3) Repousses de tournesol non clearfield ou Express Sun.
 (4) Sur vivaces, la dose peut être plus élevée. Consultez l'étiquette. Les doses les plus élevées concernent souvent le ray-grass. Attendre le stade 3-4 feuilles des graminées adventices pour intervenir. Conditions d'application : désherbez par temps poussant avec une hygrométrie supérieure à 60 %. Evitez les fortes amplitudes thermiques (supérieures à 15°C).

(5) Les huiles sont bien plus efficaces que les mouillants. La firme établit une liste positive d'huile.
 (6) A dose vivace uniquement.
 (7) Association non couverte par les firmes.
 (8) Ne pas appliquer sur sols drainés dont la teneur en argile est supérieure ou égale à 45 %.
 * Références insuffisantes.
 (a) Avant tallage.
 (b) Tallage.

Bonne efficacité sauf en cas de résistance aux antigraminées foliaires (inhibiteurs de l'ACCase fop-dime)
 Bonne efficacité
 Efficacité moyenne à satisfaisante
 Efficacité moyenne
 Efficacité moyenne à insuffisante
 Efficacité insuffisante
 * Références peu nombreuses
 - Absence de références

Attention, suite à la publication de l'arrêté Abeilles du 20 novembre 2021, en période de floraison, les applications de produits herbicides doivent être réalisés dans le créneau horaire suivant : dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil et dans les 3 heures qui suivent le coucher du soleil. Au terme de la période transitoire prévue par l'arrêté, seules les spécialités comportant une autorisation spécifique, (étiquetage – AMM), pourront être appliquées en période de floraison aux horaires prévues dans l'arrêté. (plus d'informations sur le site internet de Terres Inovia).