

## Fongicides utilisables sur pois chiche

Spécialité commerciale	Second nom commercial	Substance active (concentration)	Botrytis, sclérotinia	Ascochytose	Nb d'application max	DAR	Mention d'avertissement	Mentions de danger (règlement CLP)	Coût (€/ha) RPD 2018
Amistar	Ortiva Gold	azoxystrobine 250 g/l	0,8	0,8	2 (1) (2)	35	attention	H400, H410	29-36
Luna Sensation		Trifloxystrobine 250 g/ha + fluopyram 250 g/ha	0,8	0,8	1	21	attention	H302 - H400 - H410	130
Prosaro	Piano	prothioconazole 125 g/l + tébuconazole 125 g/l		1	2 (1)	35	attention	H315 - H319 - H361d - H410	52
Scala	Toucan	pyriméthanil 400 g/l	1,5	1,5	2	28	attention	H412	55

■ Non homologué pour cet usage

DAR : délai avant récolte (jour)

Règlement CLP : classification labelling packaging

(1) Respectez un délai minimum de 14 jours entre deux applications

(2) Une seule application par an pour sols drainés (> 45 % d'argile)

ZNT aquatique : 5 m

DVP : pour Amistar et Luna Sensation 5 m

ZNCA : pour Prosaro 5 m

La réglementation sur les produits phytosanitaires évolue (retraits, délai de commercialisation, etc...). Pour en savoir plus, consulter [www.terresinovia.fr](http://www.terresinovia.fr)

En cas de mélange, vérifier sa conformité : [www.melanges.arvalisinstitutduvegetal.fr](http://www.melanges.arvalisinstitutduvegetal.fr)

Source : Ephy Anses - Phytodata et firmes