






Spécialité commerciale	Seconde nom commercial et générique (2)	Substances actives	*pourriture grise et sclerotiniose		* anthracnose	* rouille	Nombre d'application max	DAR (j)	ZNT aquatique (m)	DVP (m)	Coût (€ HT/ha) RPD incluse	Mention d'avertissement (règlement CLP)	Mentions de danger (règlement CLP)
			Botrytis	Sclerotinia									
AMISTAR	ORTIVA GOLD, ZOXIS, AZOXYSTAR	azoxystrobine 250 g/l	0,8	0,8	0,8	1	2 (3) (4)	35	5	5	22-27	attention	H400-H410
BARKY		mancozèbe 80%			2		-	3	5	-	-	attention	H317-H335-H361d-H400-H410
IMPACT 125 FL		flutriafol 125 g/l			1 (1)		-	3	5	-	18	attention	H317-H411
PROSARO	PIANO	prothioconazole 125 g/l + tébuconazole 125 g/l			1	1	2 (3)	35	5	-	54	attention	H315-H319-H361d-H410
RHAPSODY	SERENADE ASO	Bacillus subtilis str. QST 713 14.1 g/L	8 (6)	8 (6)			6	1	5	-	-	-	-
SCALA	TOUCAN	pyriméthanol 400 g/l	1,5	1,5	1,5		2	28	5	-	52	attention	H412
SUNORG PRO	CARAMBA STAR, METCOSTAR90	métconazole 90 g/l	0,8	0,8	0,8	0,8	2	20	5	-	24-25	attention	H319-H361d-H373-H411
ZAKEO XTRA	AZERTY XTRA	azoxystrobine 200 g/l + cyproconazole 80 g/l	1	1	1	1	2 (5)	35	5	5 (5)	46	attention	H302-H332-H361d-H410

	Bonne efficacité
	Efficacité moyenne
	Efficacité insuffisante
	Manque de référence
	Non homologué pour cet usage

La réglementation sur les produits phytosanitaires évolue (retraits, délai de commercialisation, etc...). Pour en savoir plus, consulter WWW.terresinovia.fr
 AMM : Autorisation de mise sur le marché.

Règlement CLP (Classification labelling packaging) : règlement européen qui met en oeuvre les recommandations internationales du SGH (Système général harmonisé).

Avant tout mélange s'assurer du respect de la réglementation.

(1) : homologué pour cet usage via le nouveau catalogue des usages. La firme ne couvre pas cette utilisation qui ne peut se faire que sous la responsabilité de l'utilisateur.

(2) : Il existe d'autres produits génériques. Lisez attentivement l'étiquette car les données réglementaires peuvent être différentes (AMM, mentions de danger, etc..).

(3) : Respecter un délai minimum de 14 jours entre deux applications.

(4) : Une seule application par an pour sols drainés (>45 % d'argile).

(5) : Applicable à partir des premiers boutons floraux. Respecter un intervalle de 21 jours entre 2 applications. DVP de 5 m uniquement si 2 applications.

(6) : Dose maximale, 6 applications. 5 jours d'intervalle entre deux applications.