

Conditions d'application des produits

AVADEX 480

Incorporez avec la dernière préparation du sol sur 2-3 cm de profondeur, dans un délai de 2 heures après l'application. L'efficacité est plus faible en conditions sèches.

GRATIL/ADRET

Pour protéger les organismes aquatiques, n'appliquez pas sur sol artificiellement drainé ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45 %. Appliquez en conditions poussantes pour le lin. Stade optimum entre 6 et 15 cm du lin. Dans la mesure du possible, évitez une application si une forte pluviométrie est annoncée dans les 8 jours.

BASAGRAN SG/ADAGIO SG

Appliquer l'herbicide par temps poussant, température supérieure à 12°C en évitant les périodes d'amplitude thermique supérieures à 15°C. Au-delà de 4 feuilles des adventices le produit perd en efficacité.

EMBLEM/EMBLEM FLO

A l'automne, il peut sensibiliser les plantes au gel. Privilégiez des applications précoces, en dehors de période de gel annoncé dans les 10 jours. Evitez les périodes de fortes amplitudes thermiques. L'association avec BASAGRAN SG présente la même sélectivité que l'application de EMBLEM FLO seul. Elle serait même meilleure (source firme).

LONTREL SG

Appliquez l'herbicide par temps poussant, hygrométrie supérieure à 60 %, température supérieure à 12 °C en évitant les périodes d'amplitude thermique supérieures à 15 °C. Stade optimal entre 10 et 40 cm du lin. Il ne doit pas pleuvoir dans les 4 heures suivant l'application. La dose peut être modulée à 100-140 g/ha sur légumineuses et très jeunes matricaires (et bonnes conditions d'emploi).

FOX

L'efficacité de ce produit de contact est conditionnée par le stade des adventices. Mais un stade minimal du lin est à respecter : attendre le stade 5 cm du lin et 50 jours après le semis. FOX doit être appliqué sans adjuvant et sur feuillage sec. Eviter les périodes où un gel peut suivre l'application de quelques jours (4-6 jours).

Antigraminées foliaires

- Appliquez du stade 3 feuilles au début de la montaison des graminées, quel que soit le stade du lin.
- Attention tout de même, les applications d'antigraminées peuvent sensibiliser les lins au gel. Eviter les périodes de stress du lin (gel dans les 15 jours qui précèdent ou suivent l'application, sécheresse). Les applications d'automne sont déconseillées (sensibilisation au froid), en particulier dans les zones froides (Centre, Nord et Est). Utilisez les antigraminées autour de la reprise de végétation en sortie d'hiver. Dans les zones à hivers plus doux (Ouest, Sud-Ouest), l'application d'un antigraminées à l'automne est possible uniquement en cas de concurrence précoce.
- Respectez un délai de 7 à 8 jours entre un traitement antigraminées et un traitement antidicotylédones. Privilégiez le traitement antidicotylédones en premier.
- Conditions d'application pour tous les antigraminées foliaires : temps poussant, températures supérieures à 10 °C en dehors des fortes amplitudes thermiques (supérieures à 15 °C) et hygrométrie supérieure à 60 %.
- Doses et adjuvants : en bonnes conditions d'application, les doses peuvent être réduites sur certaines adventices sauf ray-grass, bromes, folle-avoine. Consultez l'étiquette. Les huiles sont bien plus efficaces que les mouillants et certaines firmes établissent une liste positive.