Présemis (1)	Pré-levée	Post-levée (1)	Composition	Dose d'AMM	Groupe HRAC	DAR (jours ou stade)	Coût (€ HT/ha (dose AMM)	Chiendent	Folle-avoine	Paturin annuel	Ray-grass	Vulpin	Vulpie	Repousses de céréales	Arroche étalée	Capselle	Chardons vivaces	Chardon marie	Chénopodes	Chrysanthème	Colza repousses	Coquelicot	Fumeterre	Gaillet	Géraniums	Jonc du crapaud	Laiterons	Lamier	Phacélie	Matricaire	Mercuriale	Morelle noire	Mouron des champs	Mouron des oiseaux	Pensée des champs	Ravenelle	Renouée persicaire	Renouée liseron	Renouée des oiseaux	Rumex	Sanve, rapistre	Seneçon	Tabouret des champs	Véronique à feuille de lierre	Véronique feuille de Perse
AVADEX 480			triallate 480 g/l	3 l/ha	N	-	51																																						
	CALLI-PRIME XTRA		mésotrione 480 g/l	0,31 l/ha	F2	-																-																				-	-		
		BASAGRAN SG	bentazone 87 %	1,4 kg/ha	C3	-	84																						-																
		EMBLEM FLO	bromoxynil 401 g/l	1 l/ha	C3	BBCH31 (lin 10 cm)	32-42																																						
		EMBLEM	bromoxynil 20 %	2 kg/ha	C3	-	32-42																																						
		GRATIL/AD RET (2)	amidosulfuron 75 %	0,04 kg/ha	B	90 j	35-36													-							-		-														-		
		LONTREL SG (3)	clopyralid 720 g/kg	0,174 kg/ha + huile 1 l/ha	0	BBCH51 (1e bou-tons flo-raux)	42																																						

Efficacité bonne, adventice sensible

Efficacité moyenne ou irrégulière

Efficacité insuffisante

AMM : autorisation de mise sur le marché.
DAR : délai avant récolte
HRAC : Herbicide Resistance Action Committee
ZNT aquatique (zone non traité) : 5 m par défaut sauf Calliprime xtra, Emblem Flo et Emblem : 20 m.

1 - Voir tableau Programmes et stratégies.
2 - Gratil : 1 application max/an au printemps. 1 application max tous les 2 an à l'automne. Ne pas appliquer sur parcelles drainées avec une teneur en argile > 45 %.
3 - ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit à base de clopyralide plus d'une fois tous les 2 ans.
4 - L'efficacité est maximale jusqu'à 3 feuilles du paturin annuel, puis elle diminue rapidement à partir du stade 4 feuilles-tallage. Pilot à dose vivace. Consultez l'étiquette.