

Principales spécialités herbicides applicables contre les adventices

Rattrapage antigraminées de postlevée (1)		Composition	Dose d'AMM	Groupe HRAC	DAR (jours)	Coût en euros HT / ha				
AGIL / CLAXON		propaquizafop 100 g/l	1,2 l/ha (annuelles) ; 2 l/ha (vivaces)	A	90	50-80				
CENTURION 240 EC 0,5 l/ha + huile 1 l/ha		clethodime 240 g/l	0,75 l/ha	A	70	32		(4)		
FOLY R / NORTO / BALISTIK 1 l/ha		clethodime 120 g/l	1 l/ha	A	70	33		(4)		
FUSILADE MAX 1,2 l/ha		fluazifop-p-butyl 125 g/l	1,25 l/ha	A	90	32		(4)		
LEOPARD 120 0,5 l/ha + huile 1 l/ha		quizalofop-p-éthyl 120 g/l	1,25 l/ha	A	90	32		(4)		
PILOT 1,2 l/ha		quizalofop-p-éthyl 50 g/l	1,2 l/ha (annuelles) ; 3 l/ha (vivaces)	A	-	35-81		(4)		
TARGA MAX 0,6 l/ha		quizalofop-p-éthyl 100 g/l	1,5 l/ha	A	110	33		(4)		

Efficacité bonne, adventice sensible

Efficacité moyenne ou irrégulièr

Efficacité insuffisante

Efficacité bonne sauf en cas de résistance aux antigraminées foliaires

? Absence de références Terres Inovia

* Références peu nombreuses

AMM : autorisation de mise sur le marché

DAR : délai avant récolte

HRAC : Herbicide Resistance Action Committee

ZNT aquatique (zone non traité) : 5 m par défaut sauf Calliprime xtra, Emblem Flo et Emblem : 20 m.

1 : Voir tableau Programmes et stratégies, guide culture lin oléagineux

1 : von

2 : 15%

3 : ne pas appliquer ce pro

3 : ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit à base de cypralide plus d'une fois tous les 2 ans
4 : L'efficacité est maximale jusqu'à 3 feuilles du paturin annuel, puis elle diminue rapidement à partir de

4 : L'efficacité est maximale jusqu'à 3 feuilles du paturin annuel, puis elle diminue rapidement à partir du stade 4 feuilles-tallage. Pilot à dose vivace. Consultez l'étiquette.

