



**Rencontres  
Techniques**  
de Terres Inovia

# **Mycosphaerella & Projet MYCO-RISK : objectifs et premiers résultats**

**Gwénola Riquet** - [g.riquet@terresinovia.fr](mailto:g.riquet@terresinovia.fr)

**Océane Saint-lys** - [o.saintlys@terresinovia.fr](mailto:o.saintlys@terresinovia.fr)

**Elodie Tourton** - [e.tourton@terresinovia.fr](mailto:e.tourton@terresinovia.fr)

**Cécilia Fontyn** - [c.fontyn@terresinovia.fr](mailto:c.fontyn@terresinovia.fr)

# Le menu du jour

Rappels (succincts) du contexte mycosphaerella

Objectifs du projet MYCORISK

Résultats mycosphaerella 2025

- Feuilles (fréquence & intensité)
- Siliques (fréquence & intensité)
- Rendement et gains nets
- Quid du PMG ?

Ce qu'il faut retenir


# Contexte et objectifs

- Maladie du colza causée par *Mycosphaerella brassicicola*, en forte progression ces dernières années
- Manque de références sur biologie, nuisibilité et facteurs de risque : seuils et périodes de surveillance absents des BSV.
- Terres Inovia souhaite fournir aux acteurs du BSV, un outil fiable d'analyse du risque.


Colza d'hiver 2022 - Frqce\_bioagresseurs : Mycosphaerella Colza d'hiver 2023 - Frqce\_bioagresseurs : Mycosphaerella Colza d'hiver 2024 - Frqce\_bioagresseurs : Mycosphaerella Colza d'hiver 2025 – Frqce\_bioagresseurs : Mycosphaerella




Source: expertise des ingénieurs développement de Terres Inovia



Source: expertise des ingénieurs développement de Terres Inovia



Source: expertise des ingénieurs développement de Terres Inovia





Source : expertise des ingénieurs développement de Terres Inovia

- Absent ou rare
- Faiblement observé ou très localisé
- Régulièrement observé
- Fréquemment observé
- Très fréquemment observé
- Territoire non couvert par l'expertise
- Aucune donnée disponible

# Objectif du projet MYCORISK

Développer et diffuser une grille opérationnelle d'estimation du risque Mycosphaerella pour orienter la surveillance, la décision de lutte intégrée et la rédaction des BSV






# Axe 1 : Comprendre le développement du mycosphaerella en fonction des facteurs climatiques


## Suivi des symptômes au champs et conditions climatiques


- notation intensité de maladie en %
  - surface Feuilles : moyenne par tiers
  - surface Siliques : moyenne globale
- suivi hebdomadaire de mars à juin



# Axe 1 : Comprendre le développement du mycosphaerella en fonction des facteurs climatiques

## Suivi des symptômes au champs et conditions climatiques





# Résultats axe 2 : mesure de la nuisibilité et optimisation de la protection

Code TI	T1 = Stade C2-D1	T2 = Stade E : AVANT l'ouverture de la première fleur	T3 = G1 (chutes 1 <sup>ère</sup> pétales/apparition des 1 <sup>ères</sup> siliques)	T4 = Stade G1 + 21j (+/- 2jours)
TEMOIN NON TRAITE				
C501				
C502	Passerelle 0,5 l/ha	Passerelle 0,5 l/ha	Propulse 0,8 l/ha	Passerelle 0,5 l/ha
C503	Passerelle 0,5 l/ha		Propulse 0,8 l/ha	
C504		Passerelle 0,5 l/ha	Propulse 0,8 l/ha	
C505			Propulse 0,8 l/ha	
C506			Propulse 0,8 l/ha	Passerelle 0,5 l/ha
C507		Propulse 0.8 l/ha		Passerelle 0,5 l/ha
C508	Passerelle 0,5 l/ha		Propulse 0,8 l/ha	Passerelle 0,5 l/ha
C509	Sunorg Pro 0,6 l/ha		Sunorg Pro 0,6 l/ha	
C510	Passerelle 0,5 l/ha		Passerelle 0,5 l/ha	
C511	Joao 0.5 l/ha		Joao 0.5 l/ha	

## Essais nuisibilité

Notations feuilles à G1+21j  
% fréquence et surface atteinte

Notations siliques  
% fréquence et surface atteinte

Rendement, PMG

**Propulse : prothioconazole (125g/l) + fluopyram (125g/l)**  
**Passerelle : difénoconazole (250 g/l)**

Sessions régionales



# Résultats axe 2 : mesure de la nuisibilité et optimisation de la protection

Code TI	T1 = Stade C2-D1	T2 = Stade E : AVANT l'ouverture de la première fleur	T3 = G1 (chutes 1 <sup>ère</sup> pétales/apparition des 1ères siliques)	T4 = Stade G1 + 21j (+/- 2jours)
C501	TEMOIN NON TRAITE			
C502	Passerelle 0,5 l/ha	Passerelle 0,5 l/ha	Propulse 0,8 l/ha	Passerelle 0,5 l/ha
C503	Passerelle 0,5 l/ha		Propulse 0,8 l/ha	
C504		Passerelle 0,5 l/ha	Propulse 0,8 l/ha	
C505			Propulse 0,8 l/ha	
C506			Propulse 0,8 l/ha	Passerelle 0,5 l/ha
C507		Propulse 0.8 l/ha		Passerelle 0,5 l/ha
C508	Passerelle 0,5 l/ha		Propulse 0,8 l/ha	Passerelle 0,5 l/ha
C509	Sunorg Pro 0,6 l/ha		Sunorg Pro 0,6 l/ha	
C510	Passerelle 0,5 l/ha		Passerelle 0,5 l/ha	
C511	Joao 0.5 l/ha		Joao 0.5 l/ha	

Evaluation de la nuisibilité intrinsèque de la maladie sur colza via une modalité « référence saine »

# Résultats axe 2 : mesure de la nuisibilité et optimisation de la protection

Code TI	T1 = Stade C2-D1	T2 = Stade E : AVANT l'ouverture de la première fleur	T3 = G1 (chutes 1 <sup>ère</sup> pétales/apparition des 1ères siliques)	T4 = Stade G1 + 21j (+/- 2jours)
C501 TEMOIN NON TRAITE				
C502	Passerelle 0,5 l/ha	Passerelle 0,5 l/ha	Propulse 0,8 l/ha	Passerelle 0,5 l/ha
C503	Passerelle 0,5 l/ha		Propulse 0,8 l/ha	
C504		Passerelle 0,5 l/ha	Propulse 0,8 l/ha	
C505			Propulse 0,8 l/ha	
C506			Propulse 0,8 l/ha	Passerelle 0,5 l/ha
C507		Propulse 0.8 l/ha		Passerelle 0,5 l/ha
C508	Passerelle 0,5 l/ha		Propulse 0,8 l/ha	Passerelle 0,5 l/ha
C509	Sunorg Pro 0,6 l/ha		Sunorg Pro 0,6 l/ha	
C510	Passerelle 0,5 l/ha		Passerelle 0,5 l/ha	
C511	Joao 0.5 l/ha		Joao 0.5 l/ha	

Evaluation de la sévérité et nuisibilité de la maladie (feuilles et siliques) en fonction du timing d'intervention.

# Résultats axe 2 : mesure de la nuisibilité et optimisation de la protection

Code TI	T1 = Stade C2-D1	T2 = Stade E : AVANT l'ouverture de la première fleur	T3 = G1 (chutes 1 <sup>ère</sup> pétales/apparition des 1ères siliques)	T4 = Stade G1 + 21j (+/- 2 jours)
C501	TEMOIN NON TRAITE			
C502	Passerelle 0,5 l/ha	Passerelle 0,5 l/ha	Propulse 0,8 l/ha	Passerelle 0,5 l/ha
C503	Passerelle 0,5 l/ha		Propulse 0,8 l/ha	
C504		Passerelle 0,5 l/ha	Propulse 0,8 l/ha	
C505			Propulse 0,8 l/ha	
C506			Propulse 0,8 l/ha	Passerelle 0,5 l/ha
C507		Propulse 0,8 l/ha		Passerelle 0,5 l/ha
C508	Passerelle 0,5 l/ha		Propulse 0,8 l/ha	Passerelle 0,5 l/ha
C509	Sunorg Pro 0,6 l/ha		Sunorg Pro 0,6 l/ha	
C510	Passerelle 0,5 l/ha		Passerelle 0,5 l/ha	
C511	Joao 0,5 l/ha		Joao 0,5 l/ha	

**Modalités hors projet  
MYCORISK –  
Evaluation de l'efficacité  
des triazoles entre elles**

→ Uniquement sur 3  
essais sur les 6 mis  
en place en 2025


# Résultats axe 2 : mesure de la nuisibilité

## Localisation des essais 2025

En 2025, 6 essais :  
3 essais Myco-risk  
3 essais hors projet


→ Choix des parcelles au **printemps** en fonction de la présence de maladie

- Essai forte présence myco
- Essai faible présence myco
- Essai non retenu



# Une nuisibilité variable au sein des essais depuis 2022

→ Le choix de la parcelle d'essai est primordial pour évaluer pleinement la nuisibilité




**~ 20% de perte de rendement sur les essais 2025**

C25MYC17004: 11.8 q/ha  
C25MYC79001: 6 q/ha


# En situation de forte fréquence de maladie sur feuilles, aucune stratégie ne contient la présence de maladie...

Efficacité des stratégies sur la fréquence de la maladie\_notation feuilles à G1+21j sur les 4 essais 2025



- Maladie fortement présente : >99% de feuilles observées avec symptômes
- Modalité 4 traitements (évaluation nuisibilité) ~ efficacité 31%
- Efficacité de l'application précoce ~ 10-15%


# MAIS les modalités avec un passage précoce ressortent sur la notation intensité feuilles




1



# En situation de forte fréquence sur siliques, les efficacités observées sont faibles...




# MAIS, sont discriminantes lorsque l'on évalue l'intensité. Les modalités avec rattrapage post G1 ressortent



- ~10-20% d'efficacité du G1 (avec ou sans passage précoce)
- Pas d'effet de l'application à C2/D1 (moda 3 VS 5 &moda 6 VS 8)
- +20 à 30% d'efficacité du relai par rapport à un G1 solo


# Les modalités avec rattrapage post G1 ressortent au rendement

Rendement en q/ha selon les stratégies et écart au témoin pour les 4 essais 2025




# Un gain de +3q/ha avec un rattrapage post G1 par rapport à un G1 solo

Gain de quintaux avec un G1 solo ou un G1 suivi d'un rattrapage sur le regroupement essais 2025



Pas de gain de quintaux avec le passage d'un C2D1 sur le regroupement essais 2025




- L'application d'un G1 solo permet un gain de +5q/ha
- L'application d'un rattrapage permet un gain de +3q/ha
- Pas de gain avec le passage d'un précoce

# Les modalités avec rattrapage post G1 ressortent au rendement

## Gains nets et coûts de passages

Gain et coût de traitement en q/ha selon les stratégies pour les 4 essais 2025



# Hypothèse de l'impact de l'intensité sur siliques sur le rendement

## Flashback RTI 2024

- Mise en place des 2 organes photosynthétiques relais : d'abord les feuilles → LAI puis les siliques → PAI
- **Phase siliques autotrophes** → seule source d'assimilats = photosynthèse des siliques
- A partir de mi-floraison → si attaque sur siliques intense avec capacité photosynthétique réduite = **impact sur rdt possible via impact sur :**
  - **Remplissage des grains → PMG**





Figure 5.22: Exemple de cinétique d'évolution des indices de surfaces photosynthétiquement actives (feuilles, LAI; tiges et siliques, PAI) et de l'assimilation nette entre le semis et le stade G4

Source: Triboï-Blondel


# Hypothèse de l'impact de l'intensité sur siliques sur le rendement

## Flashback RTTI 2024

**2024 - suivi de 3 parcelles - Bourgtheroulde 27 – J. Lieven**  
*(PMG mesuré à partir de siliques prélevées sur plantes entières, séchées et battues manuellement avant récolte)*



**Essais 2025**  
*(PMG mesuré au laboratoire d'Ardon après récolte moissonneuse)*




→ Perte des graines les plus légères/avortées à la récolte machine (avec les déchets) ?

# Des gains de quintaux avec les triazoles mais non différenciables entre elles

## Comparaison des triazoles : 2 essais

→ Pas de différence flagrante entre les triazoles mais gain de quintaux par rapport au TNT

→ Comparaison à poursuivre



# Ce qu'il faut retenir

- Données d'épidémiologie : lien entre **symptômes et données météorologiques en cours d'acquisition/analyse**
- **Une nuisibilité** évaluée en 2025 se rapprochant des remontées du terrain (= années précédentes), **en moyenne de 8.5q/ha**
- La position historique de TI semble toujours cohérente : **les stratégies incluant un rattrapage post-G1 se distinguent sur les résultats de rendement**
  - A confirmer en pluriannuel
  - La part d'impact sur le rendement du couvert (= feuilles) et des siliques reste à déterminer
  - Les traitements très précoces (C2-D1) ne semblent pas être l'optimum de gestion – données 2025 et précédentes

# Ce qu'il faut retenir

**Pas d'éléments récents permettant une évolution du conseil :**

- **Terres Inovia ne recommande pas de traitement fongicide à montaison (stade C2/D1 ou BBCH 31)**
- **Dans la majorité des cas : 1 application à G1 est suffisante pour gérer la maladie**
  - Privilégier les triazoles (prothioconazole en particulier)
  - Ne pas moduler les doses appliquées du fait de l'impact sur l'efficacité (ne pas descendre en deçà de 100g/ha de prothioconazole par exemple).
- **En cas de printemps favorable à la maladie (humide) : une 2<sup>nde</sup> application en relai, 10 à 20 jours après G1 pour limiter la montée sur siliques est possible**
  - Triazole : prothioconazole de préférence mais veiller à alterner les substances actives afin de préserver leur efficacité.

# Ce qu'il faut retenir

- PMG n'est pas impacté dans ces essais : hypothèse d'évacuation des graines légères ou avortées lors de la récole mécanique → abandon de l'évaluation du PMG en labo
- Pas de réelle différenciation entre les triazoles à ce jour (2 essais 2025). Historiquement prothioconazole plus performant (données antérieures)