

Liste des fongicides autorisés sur colza

Spécialités commerciales	Substance actives	Groupe FRAC	Dose d'AMM	Usage crucifères oléagineuses - TPA*						Arrière effet sur mycosphae-rella (protection sclérotinia)	Arrière effet sur oïdium (protection sclérotinia)	Nbr d'applica-tions max.	Mention d'avertisse-ment	Mentions de danger (règlement CLP)	DAR ou stade li-mite d'appli-cation (2)	ZNT Eau (m)	DVP (m)	DSPPR (m)	Coût indicatif (€/ha) RPD incluse
				Phoma	Sclérotinia	Oïdium	Maladies fongiques des siliques (alternaria, mycosphae-rella)	Cylindros-poriose	Limitation de la croissance des organes aériens										
Régulateur strict (pas d'action fongicide)																			
MEDAX TOP, PERMISOL	mepiquat chlorure 300 q/l + prohexadione calcium 50 g/l	-	I l/ha						(7)			2 (14)	Attention	H302-H319	F	5	-	3	24-30
Triazoles (IDM)																			
HORIZON EW, BALMORA, ZONOR (I)	tébuconazole 250 g/l	GI	I l/ha		I l/ha		(5)	(6)	(7)	bon*	bon*	I (8)	Attention Danger	H302-H318-H332-H335-H361d-H411	56 j	5	5	3	17
COLNAGO, ULYSSES, SPEKFREE (I)	tébuconazole 430 g/l	GI	0,6 l/ha		0,6 l/ha		(5)	(6)	(7)	bon*	bon*	2	Attention	H361d-H411	63 j	5	-	5	18
JOAO, ENILOR, SKEA, ALANA STAR, NEBBIA, EUSKATEL (I)	prothioconazole 250 g/l	GI	0,7 l/ha		0,5 à 0,7 l/ha	0,5 à 0,7 l/ha	(5)	(6)		très bon	très bon	2	Attention	H319-H335-H400-H410	56 j	5	5	5	13 - 18
MAGNELLO, VERTARA (I)	tébuconazole 250 g/l + difénoconazole 100 g/l	GI	0,8 l/ha	0,8 l/ha					(7)	-	-	(3)	Attention	H319-H 335-H351-H361d-H400-H410	BBCH59	5	-	10	27
PASSERELLE, DIFCOR 250 EC, LS DIFENOCONAZOLE 250, BAXI (I)	difénoconazole 250 g/l	GI	0,5 l/ha	0,5 l/ha	0,5 l/ha		(5)			bon*	moyen à bon	2	Danger	H302-H304-H319-H351-H373-H410	56j	5	-	5	21
PROSARO, PIANO, PROTENDO EXTRA, OSARO PRO, TILZOL (I)	prothioconazole 125 g/l + tébuconazole 125 g/l	GI	I l/ha		0,8 à I l/ha	0,8 à I l/ha		(6)		très bon	très bon	2	Attention	H315-H319-H335-H361d-H400-H410	56 j	5	5	5	30-34
CARAMBA STAR, SUNORG PRO, JUVENTUS, STAFFOR, METKON90, METCOSTAR 90 (I)	metconazole 90 g/l	GI	0,6 et 0,8 l/ha	0,6 l/ha	0,8 l/ha	0,8 l/ha	(5)	(6)	(7)	bon	bon	2	Attention	H319-H361d-H412	56 j	5	-	5	25
TOPREX (I)	paclobutrazone 125 g/l + difénoconazole 250 g/l	GI	0,35 l/ha					(6)	(7)	-	-	I / 3 ans	Attention	H351-H361d-H400-H410	90 j	5	-	3	16-33
Triazoles (IDM) associées																			
CARYX, TURBOMET (I)	mepiquat chlorure 210 g/l + metconazole 30 g/l	GI	I,4 l/ha					(6)	(7)	-	-	I (15)	Danger	H302-H317-H318-H332-H410	80 j	5	-	5	25
JOUST PRO (I)	azoxystrobine 150 g/l + prothioconazole 150 g/l	C3+GI	I,2 l/ha	I,2 l/ha	0,7 l/ha*	0,7 l/ha*	(5)	(6)		moyen à bon*	bon*	I	Attention	H302-H317-H319-H332-H400-H410	56 J	20	5 (16)	3	-
MAXENTIS (I)	azoxystrobine 200 g/l + prothioconazole 150 g/l	C3+GI	I l/ha		0,6 à 0,75 l/ha	0,6 à 0,75 l/ha*	(5)	(6)		moyen à bon*	bon*	I	Attention	H302-H317-H332-H400-H410	56 j	20	-	3	24 - 30

Vert : dérogation à la Spe8 à compter du 1^{er} janvier 2026
Rouge : Spe8 dès le 1^{er} janvier 2026
Noir : pas d'information
Stades d'application non concernés par l'arrêt Abeilles

- Bonne à très bonne efficacité
- Bonne efficacité parfois irrégulière
- Efficacité moyenne
- Autorisation pour cet usage
- * Références peu nombreuses
- Non notifié

La réglementation sur les produits phytosanitaires évolue (retraits, délai de commercialisation, etc.). Pour en savoir plus, consulter www.terresinovia.fr
(1) Ne peut être mélangé avec un insecticide de la famille des pyréthrinoides en période de floraison ou au cours de périodes de production d'exsudats. Pour des applications rapprochées, débutez par l'insecticide à base de pyréthrinocide puis respectez obligatoirement un délai de 24 h avant d'appliquer le fongicide.
(2) Délai recommandé pour respecter la limite maximale de résidus (LMR).
(3) Une application maximum par an en tant que limitateur de la croissance des organes aériens, 2 applications contre le phoma.
(4) Mélange autorisé par dérogation. applicable sur oidium uniquement en cas de concomitance de la maladie au moment de l'application sclérotinia. Dose de 0,25 l/ha + 0,4 l/ha à 0,3 l/ha + 0,5 l/ha.
(5) Voir efficacités et doses dans les chapitres alternaria et mycosphaerella du guide.
(6) Voir efficacités et doses dans le chapitre cylindrosporiose du guide.
(7) Voir doses d'emploi dans le chapitre régulateurs du guide. TOPREX n'est pas homologué pour une application d'automne.

(8) ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit à base de tébuconazole plus d'une fois pas an (soit 250 g/ha de tébuconazole /an)
(9) suivre les recommandations de la note commune Anses/Inrae/Terres Inovia : ne pas utliser ce fongicide seul, mais association, à demi-dose, avec un autre mode d'action efficace sur sclérotinia (triazoles de préférence)
(10) L'efficacité dépend de la demi-dose du fongicide choisi pour l'association. Ne pas associer avec un produit à base de SDHI seul (PICTOR PRO) selon la note commune résistance
(11) une seule application sur sols drainés (>45 % d'argile)
(12) sur sols à pHCaCl2 <7,2, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant la man-destrobine sur crucifères oléagineuses d'hiver plus d'une fois tous les trois ans
(13) ne pas appliquer sur sol artificiellement drainé ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45 % et ayant un pHCaCl2 < 7,2
(14) 2 applications à dose pleine (I l/ha) maximum par an et par culture en respectant un intervalle de 90 jours. Fractionnement pour chaque application possible.
(15) une application maximum à pleine dose, ou fractionnement possible en application automne/printemps (0,7 l/ha en automne et 0,7 l/ha au printemps)

AMM :Autorisation de mise sur le marché
DAR : délai avant récolte
DVP : dispositif végétalisé permanent
DSPPR : Distance de Sécurité pour les Personnes Présentes au moment du traitement et les Rési-dents
ZNCA : zone non cultivée adjacente
Règlement CLP (Classification labelling packaging) : règlement européen qui met en œuvre les re-commandations internationales du SGH (Système général harmonisé).
Avant tout mélange s'assurer du respect de la réglementation.
Consultez l'outil en ligne : <https://www.melanges.arvalisinstitutduvegetal.fr/index.php>

Spécialités commerciales	Substance actives	Groupe FRAC	Dose d'AMM	Usage crucifères oléagineuxes - TPA*						Arrière effet sur mycosphae-rella (protection sclérotinia)	Arrière effet sur oïdium (protection sclérotinia)	Nbr d'applica-tions max.	Mention d'avertisse-ment	Mentions de danger (règlement CLP)	DAR ou stade li-mite d'appli-cation (2)	ZNT Eau (m)	DVP (m)	DSPPR (m)	Coût indicatif (€/ha) RPD incluse
				Phoma	Sclérotinia	Oïdium	Maladies fongiques des siliques (alternaria, mycosphae-rella)	Cylindros-poriose	Limitation de la croissance des organes aériens										
Strobilurine (QoI) seule ou associée																			
AMISTAR,AZOXYSTAR, ZOXIS NEO	azoxystrobine 250 g/l	C3	I l/ha		I l/ha		(5)			insuffisant	insuffisant	I ou 2 (I I)	Attention	H400-H410	42 j	5	5	3	21
AMISTAR GOLD ,PRIORI GOLD (I)	azoxystrobine 125 g/l + difénoconazole 125 g/l	C3 + G I	I l/ha		I l/ha					insuffisant	insuffisant	I	Attention	H302-H332 -H351-H400-H410	BBCH69	5	-	5	38
PACK INTUITY FORCE (INTUITY + metconazole) (I)	mandestrobine 250 g/l + metconazole 90 g/l	C3 + G I	0,8 l/ha + 0,8 l/ha		0,4 l/ha + 0,4 l/ha					-	-	I (12)(13)	Attention	H319-H361 d-H410-H412	BBCH69	5	-	-	38
PACK INTUITY POWER (INTUITY + prothioconazole) (I)	mandestrobine 250 g/l + prothioconazole 250 g/l	C3 + G2	0,8 l/ha + 0,7 l/ha		0,3 l/ha + 0,3 l/ha*					-	-	I (12)(13)	Attention	H319-H335-H400-H410	BBCH69	5	5	-	40
SDHI seul ou associé																			
PICTOR PRO, CALDISTAR, ROPIC (à associer)	boscalid 50%	C2	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	(9)		(5)			insuffisant	insuffisant	I	-	H41 I	35 j	5	-	5	23
PACK ANANKE DIF (I)	isofétamide 400 g/l + difénoconazole 250 g/l	C2 + G I			0,4 l/ha + 0,4 l/ha		(5)	(6)		insuffisant	insuffisant	I	-	H41 I-H302-H304-H319-H351-H373-H410	BBCH65	5	-	5	41
PACK ANANKE PRO (I)	isofétamide 400 g/l + prothioconazole 250 g/l	C2 + G I			0,4 l/ha + 0,4 l/ha		(5)	(6)		bon*	bon*	I	-	H41 I-H319-H335-H400-H410	BBCH65	5	-	5	41
REYVDAS (I)	boscalid 200 g/l + méfentrifluconazole 100 g/l	C2 + G I	I l/ha		0,8 l/ha	0,8 l/ha*	(5)			insuffisant*	-	I	Attention	H315-H317-H319-H41 I	BBCH75	5		3	47
EFILOR, TELIA (I)	boscalid 133 g/l + metconazole 60 g/l	C2 + G I	I l/ha		0,5 l/ha	0,8 à I l/ha	(5)			moyen à bon*	bon	I	Attention	H361 d-H412	42 j	5	-	3	33-48
PACK PROTECTION COLZA (PICTOR PRO + SUNORG PRO) (I)	boscalid 50% + metconazole 90 g/l	C2 + G I			0,25 kg + 0,4 l/ha		(5)			moyen à bon*	bon	I	Attention	Voir PICTOR PRO et SUNORG PRO	56 j	5	-	-	33
PACK REVYTEC (VAYO + EFILOR) (I)	méfentrifluconazole 75 g/l + boscalid 133 g/l + metconazole 60 g/l	C2 + G I			0,6 l/ha + 0,6 l/ha		(5)	(6)		moyen à bon*	bon	I	Attention	H317-H361 d-H41 I-H412	42 j	5	-	3	46
PROPULSE,YEARLING (I)	fluopyram 125 g/l + prothioconazole 125 g/l	C2 + G I	I l/ha	0,8 l/ha	0,5 l/ha	0,8 à I l/ha	(5)	(6)		très bon	très bon	I	Attention	H400-H41 I	56 j	5	5	5	26 - 53
AVIATOR XPRO, OCEOR XPRO (I)	bixafen 75 g/l + prothioconazole 150 g/l	C2 + G I	0,8 l/ha	0,6 l/ha	0,6 à 0,8 l/ha	0,6 à 0,8 l/ha	(5)	(6)		bon à très bon*	très bon	I	Attention	H319-H335-H361 d-H410	30 j	5	5	5	32 - 53
Phénylpyrroles																			
TRESO (à associer)	fludioxonil 500 g/kg	E2	0,75 kg/ha		0,3 kg/ha + parte-naire (triazole et/ou strobilurine)					insuffisant	insuffisant	I	Attention	H317-H400-H410	BBCH 69	5	-	3	39-46
Biocontrôle associé à un fongicide : l'efficacité est dépendante du fongicide associé.																			
RHAPSODY PRO pack = RHAPSODY + PROPULSE (I)	Bacillus subtilis + fluopyram 125 g/l + prothioconazole 125 g/l	F6 +C2 + G I	2 l/ha (RHAPSODY)		2 l/ha + 0,5 l/ha					-	moyen à bon*	I	Attention	Voir PROPULSE	56 j	5	5	-	46,8

Vert : dérogation à la Spe8 à compter du 1^{er} janvier 2026
Rouge :Spe8 dès le 1^{er} janvier 2026
Noir : pas d'information
Stades d'application non concernés par l'arrêté Abeilles

Bonne à très bonne efficacité
Bonne efficacité parfois irrégulière
Efficacité moyenne
Autorisation pour cet usage
* Références peu nombreuses
- Non notifié

La réglementation sur les produits phytosanitaires évolue (retraits, délai de commercialisation, etc.). Pour en savoir plus, consulter www.terresinovia.fr
(1) Ne peut être mélangé avec un insecticide de la famille des pyréthrinoides en période de floraison ou au cours de périodes de production d'exsudats. Pour des applications rapprochées, débutez par l'insecticide à base de pyréthrinocide puis respectez obligatoirement un délai de 24 h avant d'appliquer le fongicide.
(2) Délai recommandé pour respecter la limite maximale de résidus (LMR).
(3) Une application maximum par an en tant que limitateur de la croissance des organes aériens, 2 applications contre le phoma.
(4) Mélange autorisé par dérogation. applicable sur oidium uniquement en cas de concomitance de la maladie au moment de l'application sclérotinia. Dose de 0,25 l/ha + 0,4 l/ha à 0,3 l/ha + 0,5 l/ha.
(5) Voir efficacités et doses dans les chapitres alternaria et mycosphaerella du guide.
(6) Voir efficacités et doses dans le chapitre cylindrosporiose du guide.
(7) Voir doses d'emploi dans le chapitre régulateurs du guide. TOPREX n'est pas homologué pour une application d'automne.

(8) ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit à base de tébuconazole plus d'une fois pas an (soit 250 g/ha de tébuconazole /an)
(9) suivre les recommandations de la note commune Anses/Inrae/Terres Inovia : ne pas utliser ce fongicide seul, mais association, à demi-dose, avec un autre mode d'action efficace sur sclérotinia (triazoles de préférence)
(10) L'efficacité dépend de la demi-dose du fongicide choisi pour l'association. Ne pas associer avec un produit à base de SDHI seul (PICTOR PRO) selon la note commune résistance
(11) une seule application sur sols drainés (>45 % d'argile)
(12) sur sols à pHCaCl2 <7,2, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant la mandestrobine sur crucifères oléagineuses d'hiver plus d'une fois tous les trois ans
(13) ne pas appliquer sur sol artificiellement drainé ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45 % et ayant un pHCaCl2 < 7,2
(14) 2 applications à dose pleine (I l/ha) maximum par an et par culture en respectant un intervalle de 90 jours. Fractionnement pour chaque application possible.
(15) une application maximum à pleine dose, ou fractionnement possible en application automne/printemps (0,7 l/ha en automne et 0,7 l/ha au printemps)

AMM :Autorisation de mise sur le marché
DAR : délai avant récolte
DVP : dispositif végétalisé permanent
DSPPR : Distance de Sécurité pour les Personnes Présentes au moment du traitement et les Résidents
ZNCA : zone non cultivée adjacente
Règlement CLP (Classification labelling packaging) : règlement européen qui met en œuvre les recommandations internationales du SGH (Système général harmonisé).
Avant tout mélange s'assurer du respect de la réglementation.
Consultez l'outil en ligne : <https://www.melanges.arvalisinstitutduvegetal.fr/index.php>