

Autorisation des produits à floraison au 1 ^{er} janvier 2026 Vert : emploi possible - dérogation à la phrase SPE08 Rouge : pas d'emploi - phrase SPE08 s'applique Noir : Pas d'information		Substances actives	Usage Légumineuses potagères (sèches)-TPA*				Nombre d'applications max	DAR (jours ou stade)	ZNT aquatique	DVP (m)	Mention d'avertissement (règlement CLP)	Mentions de danger (règlement CLP)
			Lentille									
			Pourriture grise et sclérotiniose*	Maladie des tâches brunes*	Oidium*	Rouille*						
Spécialité commerciale	Second nom commercial et génériques (1)		botrytis, sclérotinia	ascochytose								
AMISTAR	ZOXIS NEO,AZOXYSTAR	azoxystrobine 250 g/l	I	0,8		I	2 (2) (3)	35	5	5	attention	H400-H410-EUH208
HELIOSOUFRE S		soufre 700 g/l			6			3	5	-	danger	H318
LUNA SENSATION		trifloxystrobine 250 g/l + fluopyram 250 g/l	0,8	0,8	0,8		1	21	5	5	attention	H302-H362-H400-H410-EUH208
PICTOR ACTIVE	EDIALIS	pyraclostrobine 250 g/l + boscalide 150 g/l	I	I			1 (5)	BBCH 75	5	-	attention	H302-H315-H317-H332-H400-H410
PROSARO	PIANO,JIVE, PROTENDO EXTRA, ORASO PRO,TILZOL	prothioconazole 125 g/l + tébuconazole 125 g/l		I	I		2 (2)	35	5	-	attention	H315-H319-H335-H361d-H400-H410
RHAPSODY	SERENADE ASO	Bacillus subtilis str. QST 713 14,1 g/l	8 (4)				6	1	5	-	-	-
SCALA	SARITF,TOUCAN	pyriméthanil 400 g/l	1,5				2	28	5	-	attention	H412-EUH208
VITISAN		hydrogénocarbonate de potassium 994,9 g/kg			5		3	3	5	-	-	-

Manque de référence
 Non homologué pour cet usage

La réglementation sur les produits phytosanitaires évolue (retraits, délai de commercialisation, etc...). Pour en savoir plus, consulter www.terresinovia.fr
 AMM :Autorisation de mise sur le marché
 Règlement CLP (Classification labelling packaging) : règlement européen qui met en oeuvre les recommandations internationales du SGH (Système général harmonisé).

Avant tout mélange s'assurer du respect de la réglementation. Consultez l'outil.....
 (1) Il existe d'autres produits génériques. Lisez attentivement l'étiquette car les données réglementaires peuvent être différentes (AMM, mentions de danger, etc..)
 (2) Respecter un délai minimum de 14 jours entre deux applications
 (3) Une seule application par an pour sols drainés (>45% d'argile)
 (4) Dose maximale, 6 applications. 5 jours d'intervalle entre deux applications
 (5) Fractionnement possible en 2 applications à la dose maximale de 0,5 L/ha avec un intervalle minimum entre applications de 14 jours.