

Spécialités antidiicotylédones		Doses/ha	Coût (€ HT/ha) RPD incluse	Groupe HRAC	Ammi-élévée	Arroche étalée	Chardon	Chénopode	Capselle	Repousses de colza	Coquelicot	Ethuse	Fumeterre	Gaillet	Laiteron	Matricaire	Mercuriale	Morelle	Moutarde	Ravenelle	Pensée	Renouée des oiseaux	Renouée iséron	Renouée persicaire	Stellaire	Repousses de Tournesol	Véronique de Perse	Véronique feuille de lierre
Prélevée	CHALLENGE 600 ou COLT (1)	3 l (hiver) à 4 l (printemps)	72-96	F3																								
	NIRVANA S	4 l	84	B + K1																								(6)
	CENTIUM 36 CS	0,2 à 0,25 l	28-35	F3																								
	PROWL 400 (2)	3 l	37	K1																								
	STALLION SYNC TEC (Pois de printemps)	2,5 l	62	K1 + F3	-	-																						- -
	CHALLENGE 600 ou COLT + NIRVANA S	2+2 à 2+3	90-111	F3 + B + K1	-																							(6)
	TOUTATIS damtec	2,4 kg	80	F3																								
	CHALLENGE 600 ou COLT + CENTIUM 36 CS	2 à 2,5 l + 0,2 l	76-88	F3																								
	CHALLENGE 600 ou COLT + PROWL 400 (1)	3 l + 1,5 l	91	F3 + K1																								
	NIRVANA S + CENTIUM 36 CS	2,5 à 3 l + 0,15 l	74-85	B + K1 + F3																								(6)
	CHALLENGE 600 ou COLT + NIRVANA S + CENTIUM 36 CS	2 l + 2 l + 0,15 l	111	B + K1 + F3																								(6)
	CHALLENGE 600 ou COLT + STALLION SYNC TEC	2 l + 2 l	97	K1 + F3	-	-																						*
Postlevée	BASAGRAN SG (12)	1 à 1,4 kg	58 à 81	C3																								
	BASAGRAN SG (12) + PROWL 400 (2) (4)	0,6 kg + 1 l	47	C3+ K1																								
	COLT ou CHALLENGE 600 (1) + BASAGRAN SG (3)(12)	0,5 l + 0,3 kg	29	F3 + C3																								
	CORUM + DASH HC	0,8 à 1,25 l	54-85	B + C3																								(6)
	TROPTONE (5)	2,5 à 3,5 l	60	○	-	-																						

Spécialités antidiicotylédones		Doses/ha pour les annuelles en fonction du stade (7)	Coût (€ HT/ha) RPD incluse	Groupe HRAC	Folle-avoine	Paturin annuel	Repousses de céréales	Raygrass	Vulpin	Bonne efficacité sauf en cas de résistance aux antigraminées foliaires (inhibiteurs de l'ACCase fop-dime)									
										(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Foliaries (13)	AGIL / CLAXON / AMBITION + huile (8)	0,5 à 0,7 l	0,6 à 0,8 l	23-35	A														
	CENTURION 240EC / OGIVE vxt + huile (9) (pois de printemps)	0,5 l	0,5 l	33	A														
	ETAMINE	0,8 à 1,0 l	1,2 l	26-38	A														
	BALISTIK / FOLY R (pois de printemps)	1,0 l	1,0 l	33	A														
	FUSILADE MAX	1,0 à 1,25 l	1,25 à 1,5 l	27-41	A														
	PILOT	1,0 l	1,2 l	27-32	A														
	STRATOS ULTRA + DASH HC	1,0 l	1,2 l	27-33	A														
	TARGA MAX	0,5 l	0,6 l	27-33	A														
	KERB FLO (10) sur pois d'hiver	1,875 l	1,875 l	40-44	K1														
	AVADEX 480 (11)	3,0 l	50	N															
	BONALAN (11)	6,0 l	50	K1	-	-													
Racinaire																			

(a) Avant tallage
(b) Tallage
(1) CHALLENGE 600 est homologué à 3 l/ha sur féverole et pois d'hiver et à 4 l/ha sur féverole et pois de printemps. PAPEL/COLT est homologué à 4,5 l/ha. CHALLENGE peut s'appliquer en postlevée à 0,5 l/ha sans fractionnement à condition de ne pas l'avoir appliquée, au préalable, en prélevée. COLT peut s'appliquer à 0,5 l/ha en postlevée en une application non fractionnable après une dose maximale de COLT à 3 l/ha. COLT peut être fractionnée en 2 x 0,25 l/ha en postlevée uniquement si absence d'application en prélevée.
(2) Autres spécialités : BAROUD SC, PENTIUM FLO.
(3) Le mélange CHALLENGE + BASAGRAN n'est pas recommandé par les firmes. Son utilisation se fera sous la responsabilité de l'utilisateur mais les données Terres Inovia montre une parfaite sélectivité.
(4) Ces doses peuvent être fractionnées en deux applications.
(5) Pour des raisons de sélectivité, il est préférable de limiter cette application aux zones de chardons.
(6) repousses de tournesol non clearfield ou express Sun. Attention, sur repousses de tournesol Clearfield® ou Express Sun®, Corum reste très insuffisant. Il faut dans ce cas préférer Basagran SG 1,4 kg/ha sur repousses à 2 feuilles.
(7) Les doses les plus élevées concernent souvent le ray-grass. Sur vivaces, la dose peut être plus élevée. Consultez l'étiquette.
(8) Les huiles sont bien plus efficaces que les mouillants. Certaines firmes établissent une liste positive d'huile.
(9) A dose vivace uniquement.
(10) Applicable à 4-5 feuilles du pois. Utilisation au printemps non compatible avec le DAR. Autres spécialités : SETANTA FLO, REDOUTABLE PLUS Application précoce, sur adventives jeunes.
(11) Applicable en pré-semis incorporé. L'efficacité est plus faible en conditions sèches (semis précoces fin septembre-début octobre). Efficacité donnée sur levée d'automne de folle-avoine.
(12) BASAGRAN SG : uniquement sur pois de printemps. BASAGRAN SG est substitutable en partie par CORUM : se référer au tableau des programmes conseillés pour les correspondances.