

Spécialité commerciale	Second nom commercial et génériques (1)	Substances actives	Lupin doses d’AMM			Nb d'application max	DAR (j)	ZNT aqua-tique (m)	DVP (m)	Coût (€ HT/ha) RPD incluse	Mention d'avertissement (règlement CLP)	Mentions de danger (règlement CLP)	Délai de rentrée (DRE en heures)
			Botrytis (pourriture grise) / Sclerotinia (sclérotiniose)	Anthracnose	Rouille								
AMISTAR	ORTIVA GOLD, ZOXIS, AZOXYSTAR	azoxystrobine 250 g/l	0,8	0,8	1	2 (3) (4)	35	5	5	22-27	attention	H400, H410	6
PICTOR ACTIV	EDIALIS	pyraclostrobine 250 g/l + boscalide 150 g/l	1	1		1 (7)	BBCH 75	5	-	48	attention	H302, H315, H317, H400, H410	48
PROSARO	PIANO	prothioconazole 125 g/l + tébuconazole 125 g/l		1 (1)	1 (1)	2 (3)	35	5	-	54	attention	H315, H319, H361d, H410	6
RHAPSODY	SERENADE ASO	Bacillus subtilis str. QST 713 14,1 g/l	1,5 (1)	1,5 (1)		2	28	5	-	52	attention	H412	6
SCALA (5)	SARI TF, TOUCAN	pyriméthanil 400 g/l	8 (5)	8 (5)		6	1	5	-	-	-	-	-
SUNORG PRO	CARAMBA STAR, METCOSTAR90	métconazole 90 g/l	0,8	0,8	0,8	2	20	5	-	24-25	attention	H319, H361d, H373, H411	24

bonne efficacité

Efficacité moyenne

Efficacité insuffisante

manque de référence

non homologué pour cet usage

Attention, suite à la publication de l'arrêté Abeilles du 20 novembre 2021, en période de floraison, les applications de produits fongicides doivent être réalisés dans le créneau horaire suivant : dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil et dans les 3 heures qui suivent le coucher du soleil. Au terme de la période transitoire prévue par l'arrêté, seules les spécialités comportant une autorisation spécifique,(étiquetage – AMM), pourront être appliquées en période de floraison aux horaires prévues dans l'arrêté. (plus d'informations sur le site internet de Terres Inovia).

La réglementation sur les produits phytosanitaires évolue (retraits, délai de commercialisation, etc...). Pour en savoir plus, consulter [www.terresinovia.fr](http://www.terresinovia.fr)

AMM : Autorisation de mise sur le marché.

Règlement CLP (Classification labelling packaging) : règlement européen qui met en oeuvre les recommandations internationales du SGH (Système général harmonisé).

Avant tout mélange s'assurer du respect de la réglementation.

(1) Homologué pour cet usage via le nouveau catalogue des usages. La firme ne couvre pas cette utilisation qui ne peut se faire que sous la responsabilité de l'utilisateur.

(2) Il existe d'autres produits génériques. Lisez attentivement l'étiquette car les données réglementaires peuvent être différentes (AMM, mentions de danger, etc..).

(3) Respecter un délai minimum de 14 jours entre deux applications.

(4) Une seule application par an pour sols drainés (>45 % d'argile).

(5) Dose maximale, 6 applications. 5 jours d'intervalle entre deux applications.

(6) Ne pas utiliser en présence d'abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la période de floraison, ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.

(7) Fractionnement possible en 2 applications à la dose maximale de 0,5l/ha avec un intervalle minimum entre applications de 14 jours.