

Caractéristiques des spécialités homologuées sur pois chiche

Compte tenu d'un déficit de solutions en post-levée, une stratégie à base d'un herbicide de prélevée reste préférable.

Spécialités antidiicotylédones	Prélevée	Doses/ha	Coût (€ HT/ha) RPD incluse	Nouveau groupe HRAC	Ammi-élevée																						
					Arroche étaiée	Chardon	Chénopode	Capselle	Repousses de colza	Coquelicot	Datura	Ethuse	Fumeterre	Gaillet	Laiteron	Matricaire	Mercuriale	Morelle	Moutarde	Ravenelle	Pensée	Renouée des oiseaux	Renouée persicaire	Sénéçon	Stellaire	Repousses de tournesol	Véronique de Perse
CHALLENGE 600		3 l	76	34																							
NIRVANA S (1)		1,5 à 2 l	31 à 42	2 + 3	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(3)	*	*
PROWL 400		3 l	37	3																							
CHALLENGE 600 + NIRVANA S (1)		2 + 1,5 à 2 l	79-90	34 + 2 + 3	-																					(3)	
CHALLENGE 600 + PROWL 400		3 l + 1,5 l	90	34 + 3																							
CHALLENGE 600 (2)		0,5 l	12	34																							
LENTAGRAN (8)		2 kg fractionnable en 2*1 kg	100	6	-																						
ONYX (8)		1,5 l	54	6	-																						
ONYX + CHALLENGE 600 (2)(7)(8)		1 l + 0,5 l	48	34 + 6	-	*			*			*															

Spécialités antigraminées	Post-levée	Doses/ha en fonction du stade (4)	Coût (€ HT/ha) RPD incluse	Nouveau groupe HRAC	Folle-avoine		Paturin annuel		Repousses de céréales		Ray-grass		Vulpin		
					(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	
CENTURION 240EC/OGIVE vxt + huile (5)		0,5 l	0,5 l	32	1										
ETAMINE		0,8 à 1 l	1,2 l	27-40	1										
FOLY R/BALISTIK		1 l	1 l	33	1										
FUSILADE MAX		1 à 1,25 l	1,25 à 1,5 l	27-41	1										
PILOT		1 l	1,2 l	29-37	1										
STRATOS ULTRA + DASH HC		1 l	1,2 l	27-33	1										
TARGA MAX		0,5 l	0,6 l	27-33	1										
KERB FLO en prélevée		1,875 l	1,875 l	40-44	3										

 Bonne efficacité sauf en cas de résistance aux antigraminées foliaires (inhibiteurs de l'ACCase pop-dime).

 Bonne efficacité.

 Efficacité moyenne

 Efficacité insuffisante

Les dégradés de couleurs expriment la différence d'efficacité selon les conditions pédoclimatiques.

- Absence de références

(1) Dose à moduler selon type de sol. La dose de 2 l/ha est à réserver aux sols argileux. Ne pas utiliser NIRVANA S sur sols sableux ou filtrants. Association non couverte par les firmes.

(2) CHALLENGE 600 peut être utilisé en post-levée à condition de ne pas avoir été appliqué en prélevée. Pour un programme, choisir PROWL ou NIRVANA en prélevée. Appliquez sur très jeunes adventices (maxi 2 feuilles).

(3) Repousses de tournesol non Clearfield ou Express Sun.

(4) Sur vivaces, la dose peut être plus élevée. Consultez l'étiquette. Les doses les plus élevées concernent souvent le ray-grass. Stade (a) = avant tallage stade (b) = tallage. Attendre le stade 3-4 feuilles des graminées adventices pour intervenir. Conditions d'application : désherbez par temps poussant avec une hygrométrie supérieure à 60 %. Evitez les fortes amplitudes thermiques (supérieures à 15°C).

(5) Les huiles sont bien plus efficaces que les mouillants. La firme établit une liste positive d'huile.

(6) A dose vivace uniquement.

(7) Association non couverte par les firmes.

(8) Ne pas appliquer sur sols drainés dont la teneur en argile est supérieure ou égale à 45 %.

* Références insuffisantes.